



- |    |  |  |
|----|--|--|
| 71 | Côtes toutes égales et développées en aile épaisse   | PACHYPERMÉS, p. 306.   |
|    |  | Côtes inégales   |
| 72 | Carpelles à bords écartés (74, coupe transversale schématisique) : côtes marginales développées en large aile membraneuse (72, 73) | ANGOSPERMÉS, p. 299.   |
|    |  | Carpelles à bords contigus (75, coupe transversale schématisique), développés en marge épaisse ou mince formant un rebord (76) |



- |    |  |  |
|----|--|--|
| 73 | Carpelles pourvus de côtes primaires et de côtes secondaires             | 74   |
|    |  | Carpelles pourvus seulement de côtes primaires         |
| 74 | Côtes secondaires hérissées d'aiguillons (77)                            | CAUCALINÉS, p. 295.                                    |
|    |  | Côtes dépourvues d'aiguillons (78)                     |
| 75 | Grains à face commissurale roulée par les bords (79)                     | 76   |
|    |  | Grain à face commissurale plane                        |
| 76 | Fruit comprimé par le côté, atténué (81) ou muni d'un bec (80) au sommet | SCARDININÉS, p. 322.                                   |
|    |  | Fruit renflé, ni atténué ni muni de bec au sommet (82) |



- |    |   |   |
|----|---|---|
| 77 | Fruit à section transversale non orbiculaire (83, 84)                 | AMURINÉS, p. 313.   |
|    |   | Fruit à section transversale orbiculaire (85)                 |
| 78 | Fruit à plusieurs carpelles se séparant à la maturité (86)            | 79  |
|    |   | Fruit ne se divisant pas à la maturité en plusieurs carpelles |
| 79 | Carpelles monospermes indéhiscentes (87)                              | 80  |
|    |   | Carpelles polyspermes ord. déhiscentes (88, 89)               |
| 80 | Étamines soudées par les filets en un tube qui entoure le pistil (90) | MALVACÉES, p. 164.  |
|    |   | Étamines à filets libres                                      |