


	Lobe postérieur de la corolle <i>enveloppé</i> par les autres dans le bouton.	207
207	Graines <i>plusieurs</i> dans chaque loge (163, en coupe longitudinale)	RHINANTHES, p. 495. MILANINIFES, p. 409.
	Graines <i>une-deux</i> dans chaque loge	
208	Fleurs mâles ou capitales, les <i>féminelles</i> solitaires ou en <i>séparates</i> bifères	AMBROSIALES, p. 434.
	Fleurs <i>toutes</i> en capitules multiflores	
209	Corolle <i>bilabée</i>	209
	Corolle <i>non bilabée</i>	211
210	Ovaire <i>supère</i> (98, schéma)	GLOBULARINÉS, p. 328.
	Ovaire <i>infère</i> (99, schéma)	CARDIFOLIALES, p. 331.
211	Étamines à anthers <i>libres</i>	212
	Étamines <i>soudées</i> par les anthers	214
212	Pour fruit, un <i>akène</i> indéhiscent	PARASOLALES, p. 345.
	Pour fruit, une <i>capsule</i> ou une <i>baie</i>	213
213	Fruit <i>capulaire</i>	CAMPANULACÉS, p. 436.
	Fruit <i>lacciforme</i>	SAMBICIALES, p. 370.



214	Pour fruit, une <i>capsule déhiscente</i>	CAMPANULACÉS, p. 436.
	Pour fruit, un <i>akène indéhiscent</i>	215
215	Fleurons <i>trois</i> ou au moins <i>deux</i> du centre <i>tubuleux</i>	216
	Fleurons <i>tous ligulés</i> (164)	240
	Style des fleurs hermaphrodites <i>ni articulé ni renflé</i> en nœud vers le sommet (165). Fleurons de la circonférence ord. <i>ligulés</i> , rarement <i>tubuleux</i>	217
216	Style des fleurs hermaphrodites <i>articulé ou renflé</i> en nœud vers le sommet (166). Fleurons ord. <i>tubuleux</i>	234
	Anthers <i>dépourvues</i> à la base d'appendices filiformes	218
217	Anthers <i>pourvues</i> à la base d'appendices filiformes (167)	228
	Réceptacle <i>dépourvu</i> de paillettes	219
218	Réceptacle <i>muni</i> de paillettes au moins à la circonférence	233
219	Akènes <i>munis</i> d'une aigrette <i>poilue</i> (168)	220
	Akènes <i>dépourvus</i> d'aigrette <i>poilue</i>	226
220	Akènes <i>munis</i> de côtes (168)	221
	Akènes <i>dépourvus</i> de côtes	225
221	Capitules <i>homogames</i>	222
	Capitules <i>hétérogames</i>	223