

	Fruit à carpelles se repliant pour former les cloisons (216). Styles ord. 3	329
328	Fruit à carpelles ne se repliant pas, mais se séparant, et portant une cloison au milieu de leur face interne. Style ord. 1	330
	Divisions du périanthe à onglets très longs. Souche bulbeuse (217)	COTONÉES, p. 389.
329	Divisions du périanthe à onglets très courts. Souche non bulbeuse	VÉRGINÉES, p. 389.
	Racines fibreuse. Pédoncules articulés	ANTHURACÉES, p. 603.
330	Racines bulbeuses (217). Pédoncules non articulés	331
331	Graines comprimées en disque plan (218)	DISCOSPERMES, p. 390.
	Graines globuleuses (219) ou munies d'angles	HYASTRATES, p. 594.
332	Fleurs hermaphrodites	333
	Fleurs dioïques	340
	Étamines six	334
333	Étamines trois	335
	Périanthe à gorge dépourvue de couronne pétaloïde	AMARYLLIÈRES, p. 614.
334	Périanthe à gorge pourvue d'une couronne pétaloïde (220)	NACÉES, p. 615.



	Étamines libres. Fleurs presque symétriques	INDIÈES, p. 609.
335	Étamines à filets soudés avec le style. Fleurs évidemment asymétriques (221)	336
	Deux étamines fertiles (222)	CYRILLIÈRES, p. 613
336	Une seule étamine fertile	337
	Masses polliniques non atténuées en esudicule à la base	338
337	Masses polliniques atténuées en esudicule à la base (223)	339
	Masses polliniques presque palmées. Four souche, des fibres cylindriques non ramifiées	NÉOPIÈRES, p. 619.
338	Masses polliniques très compactes. Four souche, des fibres rameuses, un rhizome ou un tubercule	MALACODÈRES, p. 623.
	Souche fibreuse. Anthère fertile libre	GASTRODÈRES, p. 622.
339	Souche tuberculeuse. Anthère fertile soudée au gynostème, c'est-à-dire, à la colonne des filets et du style	OPARCIÈRES, p. 624.
	Plantes non aquatiques	DIOSCORIÈRES, p. 608.
340	Plantes aquatiques	341
	Ovaire à plusieurs loges. Stigmates six	STRATIOTIÈRES, p. 622.
341	Ovaire à une loge. Stigmates trois	VALIANTINIÈRES, p. 633.
	Périanthe à quatre divisions herbacées	POTAMOÈRES, p. 625.
342	Périanthe à six divisions, dont trois extérieures herbacées et trois intérieures pétaloïdes (224)	343