


Var. *n. spencerianum*, disque stigmatifère lobé jusqu'à la base; var. *γ minimum*, disque lobé jusqu'au milieu.



Pl. XIV. — 1. *Nigella arvensis*, fleur, 1/2 gr. n. — 2. Feuille, 1/2 gr. n. — 3. *N. pinnatifida*, fleur, 1/2 gr. n. — 4. Feuille, 1/2, gr. n.

IV. — PAPAVERACÉES Juss.

Fleurs régulières, hermaphrodites. Sép. 3, larges, concaves, tombant ordinairement à l'épanouissement de la fleur. Pét. 4, chiffonnées dans le bouton, subégales, rapidement caduques. Et. libres, hypogyues, normalement inclinées. Ovaire supère. Stigmates sessiles rayonnants ou portés sur 1-2 styles courts. Capsule polysperme, subglobuleuse, ovoïde, claviforme ou allongée en silique. Embryon droit. Graines ord. petites. — Pl. herbacées, à latex incolore ou coloré, âcre ou narcotique. Feuilles alternes jamais entières, souvent ginuques.

1	Étamines 4.	6. HYPERCUM.	2
	Étamines en nombre indéfini		3
2	Fruit capsulaire globuleux ou ovoïde		4
	Fruit allongé en forme de silique		
	Stigmates libres. Capsule s'ouvrant en plusieurs valves	2. MECONOPSIS.	
3	Stigmates confluent rayonnants. Capsule s'ouvrant par des trous placés sous les stigmates.	1. PAPAVER.	
	Capsule à 3-4 valves.	3. ROEMERIA.	5
4	Capsule à 2 valves		
	Silique longue de 3-5 cent. Fleurs en ombelle pauciflore.	3. CHELIDONIUM.	
5	Silique de 10-20 cent. Fleurs subsolitaires terminales.	4. CLAUDEUM.	

Actéog. — Flore de France.