

- Pédicelles épais, 3 fois plus courts que la capsule. Grappe ne s'allongeant pas après la floraison. Fleurs purpurines (Pl. XVIII, fig. 1).  
 Var. 3 *digitata*, bractées incisées digitées.
- Pédicelles aussi longs que la capsule. Grappe s'allongeant après la floraison. Fleurs purpurines ou blanches.  
 Var. 3 *integrata*, bractées entières.
184. *C. fabacea* Pers.  
 C. lève 2.  
 V. Montagnes. RR.
185. *C. solida* Smith.  
 C. à bulbe plein 2.  
 V. Haies. RR.



Pl. XVIII. — 1. *Corydalis fabacea*, sommité, 1/2 gr. n. — 2. *C. lutea*, sommité, 1/2 gr. n. — 3. *C. flavicincta*, sommité, 1/2 gr. n.

Sect. 3. — *Capnoides* DC.

- Pédicelle égalant la capsule. Stels persistant. Pétioles dépourvus de vrille. Fleurs jaunes. Pi. étancé (Pl. XVIII, fig. 2).
- 1 Pédicelle plus court que la capsule. Style caduc. Pétioles terminés par une vrille ramense. Fleurs d'un blanc jaunâtre. Pl. annuelle (Pl. XVIII, fig. 3).
186. *C. lutea* DC.  
 C. jaune 2.  
 V.-E. Vieux murs. RR.
187. *C. claviculata* DC.  
 C. à vrilles ().  
 R. Lieux incultes R.

VI. — CRUCIFÈRES Juss.

Fleurs ord. régulières, herm. Sép. 4, caducs. Pét. 4, alternes, en crois. Étamines hypogyues, libres, tétradyames; anthères biloculaires. Style 1. Stigmate entier ou à 2 lobes. Ovaire 1, supère. Fruit tantôt beaucoup plus long que large (silique), tantôt presque aussi large que long (silicule), rarement uniloculaire, indehiscent ou articulé, ord. déhiscent, bivalve, à 2 loges séparées par une cloison longitudinale. Placentas 2, latéraux, placés entre les valves. Endosperme nul; radicle ascendante.

A. — SILIQUEUSES.

Fruit beaucoup plus long que large (silique).

- 1 Silique articulée moniliforme ou non articulée renflée spongieuse.
- 1 RAPHANUS.
- 2 Silique ni articulée ni renflée spongieuse
- 3 Valves dépourvues de nervures
- 2 Valves munies de 1-3 nervures
- 5