


Cheiranthées GG.

Siliques non articulées. Cotylédons plans.

8. HESPERIS L. Julicane. Pl. XXI.

Calice bossu à la base. Stigmate divisé en 2 lames ovales, obtuses, dressées-conmeentes. Siliques cylindriques. Valves concaves, 1-nerées. Graines sur 1 rang, souvent ailées. Cotylédons entiers.



Pl. XXI. — 1. *Maricardula arvensis*, sommet, 1/2 gr. n. — 2. *Hesperis laciniata*, sommet, 1/2 gr. n. — 3. Feuille. — 4. *Malcolmia africana*, sommet, 1/2 gr. n. — 5. *Matthiola sinuata*, sommet, 1/2 gr. n. — 6. Feuille. — 7. Siliques. — 8. *M. tritica*, sommet, 1/3 gr. n.

- Fleurs en grappe corymbiformes. Onglet des pétales plus long que les sépales. Feuilles toutes lanugineuses dentées, pétiolées. Fl. odorantes, violettes.
218. *H. matronalis* L.
J. des dames ☉ ou ☽.
E. Haies, buissons. R.
- Var. *zylvestris*, feuilles inf. cordiformes profondément dentées. Fl. peu odorantes.
- Fleurs en grappe allongée. Onglet des pétales non plus long que les sépales. Feuilles inférieures pinnatifides, les supérieures sessiles (Pl. XXI, fig. 2, 3).
219. *H. laciniata* All.
J. laciniée ♀.
E. Rochers, S.-R.R.

9. MALCOLMIA H. Br. Malcolmie. Pl. XXI.

Stigmate divisé en 2 lobes aigus acuminés, convergents. Siliques cylindriques. Valves concaves, 1-nerées. Graines sur 1 rang, non ailées. Cotylédons entiers.