

## XIX. — LINÉES DC.

Pl. régul., hermaphr. Sép. 4-5, persistants. Pét. 4-5, caduce. Étam. fertiles 4-5, à filets un peu ronds à la base. Styles 3-5. Capsule subglobuleuse, à 3-5 loges subdivisées par une fausse cloison en 5 loges secondaires monospermes. Déhiscence septicide, à 3-5 valves. Graines sans périsperme. Embryon droit.

- 1 | Calice à 4 divisions *bi-trifides*. Pl. à quatre parties 2. RADICOLA.  
 | Calice à 5 sépales entiers. Pl. à cinq parties 1. LINUM.

## 1. LINUM L. Lin. Pl. XLVIII.

Sép. 5, libres dès la base, entiers. Pét. 5; Étam. 3. Styles 3-5. Capsule à 3-5 loges subdivisées chacune en 2 logettes.



Pl. XLVIII. — 1. *Linum catharticum*, part. — 2. *Linum catharticum*, fleur, 1/2 gr. n. — 3. *L. catharticum*, sommité, 1/2 gr. n. — 4. *L. catharticum*, sommité, 1/2 gr. n. — 5. *L. catharticum*, sommité, 1/2 gr. n. — 6. *Radiola linoides*, part, 1/2 gr. n.

- |   |   |                 |   |
|---|---|-----------------|---|
| 1 | Feuilles munies de 2 glandes à la base. Pét. à onglets soudés | 1. SYLLINUM.    | 2 |
|   |   |                 |   |
| 2 | Feuilles alternes ou sparses                                  | 2. EULINUM.     |   |
|   |   | 3. CATHARTICUM. |   |

## Sect. 1. Syllinum Griseb.

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Pl. vivace, à fl. d'un jaune doré, larges de 3 cent. Feuilles oblongues-spatulées, à une seule nervure, bordées d'une membrane cartilagineuse transparente (Pl. XLVIII, fig. 2). | 705. <i>L. campanulatum</i>                              |
|   |  | <i>L. campanulatum</i> L.<br>E. Région des oliviers, AC. |