

trité. Feuilles lancéolées, entières, opposées ou *A. Coteaux*, S.-AC.
verticillées. — Arbruste glabre (Pl. LV, fig. 1).
Utilisé pour la tannerie. Fruits toxiques.

XXXIII. — CÉLASTRINÉES R. Br.

Fl. hermaphrod. ou unisexuelles, régul. Calice gamosépale, à 4-5 div. Pét. 4-5, alternes, libres, insérés sur le calice. Étam. 4-5, libres. Style court, stigmaté lobé. Ovaire ord. libre, à 2-3 carpelles. Fruit capsulaire, à déhiscence loculicide, à loges mono-dispermes. Graines munies d'un arille. Embryon droit, périsperme charnu. — Pl. ligneuses à feuilles indivises.

1. EVONYMUS Tourn. Fusain, Pl. LV.

Calice à 4-5 divis., plan. Pét. 4-5. Étam. 4-5. Fruit capsulaire à 3-5 loges et à 3-5 angles, à valves corinnes portant la cloison au milieu de la face interne. Graines 1-2 dans chaque loge; arille charnu.



Pl. LV. — 1. *Coriaria myrsifolia*, portion de rameau, 1/2 gr. n. — 2. *Staphylea pennata*, inflorescence, 1/2 gr. n. — 3. *Evonymus europaeus*, inflorescence, 1/2 gr. n.

Calice à divisions ciliées. Pét. orbiculaires. Étam. plus courtes que le calice. Capsule ord. à cinq angles; angles aigus, minces, ailes. Jeunes rameaux arrondis.

Calice à div. non ciliées. Pét. oblongs. Étam. égalant le calice. Capsule ord. à quatre angles; angles obtus, épais, non ailés. Jeunes rameaux à 4 angles. — Arille ord. orangé (Pl. LV, fig. 2).

Fruit irritant, purgatif; bouilli dans du vinaigre, est employé contre le gale des animaux; le bois fournit un charbon employé par les dessinateurs. — Var. δ *fructu albo*, arille blanc.

824. *E. latifolius* Scop.
P. à feuilles larges H.
V. *A. Montagne*, R.

825. *E. europaeus* L.
P. d'Europe H.
V. *A. Bois*, *haies*, CC.

XXXIV. — STAPHYLÉACÉES Bartl.

Fl. hermaphr. ou polygames, régulières. Calice gamosépale, à 5 div. Pét. 5, alternes, libres, insérés sur un disque hypogyne non adhérent au calice. Étam. 5,

Actéog. — Flore de France.