


- Bractées persistantes, subulées. Gousse non ridée à la maturité. Graines 3-4, lenticulaires. — à la maturité brunes marbrées de fauve, et noires à la mureur. Fl. bleues.
- Bractées caduques. Gousse mère munie de rides longitudinales. Graines ovoïdes-globuleuses
- Graines larges de 5 mm., n'égalant que les deux tiers de la cavité de la gousse qui renferme chacune d'elles, blanchâtres avec un réseau de lignes noires. Feuilles à folioles canaliculées. — Fl. bleues.
- Graines larges de 10 mm., égalant toute la cavité de la gousse qui renferme chacune d'elles, d'un gris foncé strié de taches blanches et fauves non disposés en réseau. Folioles planes.
887. *L. hirsutus* L.
L. hérissé ☉.
V. E. Moissons. RR.
888. *L. reticulatus* Desv.
L. réticulé ☉.
E. Lieux sablonneux. R.
889. *L. angustifolius* L.
L. à feuilles étroites ☉.
A. Lieux sablonneux. RR.



Pl. LX. — 1. *Ononis asperum*, part. 1/2 gr. n. — 2. *Argyrotolium humanum*, inflorescence et gousses, 1/2 gr. n. — 3. *Adonocarpus grandiflorus*, inflorescence, 1/2 gr. n. — 4. *A. commutatus*, part. 1/2 gr. n. — 5. *Lupinus termis*, étaminate et fertile, 1/2 gr. n. — 6. *Ononis Nativa*, inflorescence, 1/2 gr. n.

11. ONONIS L. Bugrane.

Calice persistant, campanulé, à 5 dents profondes. Étendard orlé, à dos caréné. Carène terminée en bec. Style subulé, geniculé en son milieu. Gousse subsessile, ovoïde, oblongue ou orbiculaire, saillante ou incluse. Funicule non dilaté en stipite. — Stipules soudées au pétiole.

- 1 (Pédoncule commun articulé vers le sommet) 1. NATIVA.
1 (Pédoncule commun non articulé vers le sommet) 2. BUBANA.

Sect. 1. Nativa Mench. Pl. LX.

- 1 (Pédoncule portant plusieurs fleurs)
1 (Pédoncule portant une seule fleur)

ALCOU. — Flore de France.