

- Capitules ovales, élargis à la base. Calice brusquement dilaté sous les dents, couvert de poils blancs. — Dents du calice longuement atténuées au sommet.
- 8 Capitules cylindriques, non élargis à la base. Calice cylindrique, non dilaté à la naissance des dents, couvert de poils bruns. — Dents spinulentes.

## Sect. 3. Galearia Presl.

- Bractées grandes, lancéolées, formant extérieurement un involucre multipartit égalant les calices. — Lèvre sup. du calice figurant un casque et terminée par 2 dents sétacées dirigées en bas, saillantes (Pl. LXXVII, fig. 1).
- 1 Bractées très petites, tronquées, formant extérieurement un petit involucre très court
997. *T. fragiferum* L.  
T. Porte-Fraise 2.  
A. Lieux herbeux. C.



Pl. LIVII. — 1. *Trifolium fragiferum*, sort, 1/2 gr. n. — 2. *T. repens*, part, 1/2 gr. n. — 3. *T. procumbens*, part, 1/2 gr. n. — 4. *T. filiforme*, sommet, 1/2 gr. n.

- Pl. évidemment pédonculées. — purpurines ou blanches. Lèvre sup. du calice fructifère ovale, obtuse, terminée par 2 dents sétacées saillantes. Tiges ascendantes.
- 2 Pl. presque sessiles. Lèvre sup. du calice fructifère oblongue, prolongée en cône porrigé, terminée par 2 dents sétacées longues, saillantes, divergentes. Tiges ascendantes.
- 3 Lèvre sup. du calice fructifère globuleuse, non porrigée, terminée par 2 dents sétacées courtes, cachées dans le tomentum, réfléchies. Tiges couchées.
998. *T. Clusii* G.  
T. de Clusius 1.  
M. Région méditerr. R.
999. *T. resupinatum* L.  
T. resupiné 1.  
V. E. Lieux herbeux. B.
1000. *T. tomentosum* L.  
T. tomenteux 1.  
V. Région des oliviers. R.