


- Stolons souterrains, jaunâtres, munis d'écaillés opposées, distantes. — Fl. grandes, purpurines, penchées avant la floraison. Tige présentant 2-4 lignes saillantes pubescentes. **1346. E. alsinifolium** Vill.
 E. à feuilles d'alsine ?
 E. Lieux hum. des mont. B.
- Stolons érigés, munis de feuilles opposées, distantes. Fl. dressées avant la floraison. — Feuilles arrondies à la base, aiguës, non acuminées, dentées, les moyennes sessiles. Tige radicante à la base, puis dressée, à 2-4 angles saillants. **1347. E. virgatum** Fr.
 E. rayé ?
 E. Lieux humides, RR.
- Fl. penchées avant la floraison. 4
- 5



Pl. XCV. — 1. *Epilobium hirsutum*, sommets fleuris, 1/2 gr. n. — 2. *E. montanum*, sommets fleuris, 1/2 gr. n.

- Tiges subuliformes, radicantes à la base, puis dressées, présentant deux lignes saillantes pubescentes. Feuilles minces, d'un vert pâle, toutes pétiolées. **1348. E. alpinum** L.
 E. des Alpes ?
 E. Htes montagnes, R.
- Tiges couchées-radicantes à la base, puis dressées, ne présentant pas de lignes saillantes. Feuilles canaliculées à la base, les moyennes sessiles. **1349. E. palustre** L.
 E. des marais ?
 E. Prés tourbeux, AC.
- Var. *a. genuinum*, feuilles lanco-lées linéaires glabres, tige simple, pauciflore ; *β majus*, feuilles semblables, mais pubescentes, tige plus élevée, multiflore ; *γ laxiusculifolium*, feuilles étroites linéaires, à bords roulés en dessous ; *δ schmidianum*, tige naine pauciflore, feuilles larges fortement dentées.
- Plante pourvue à la base de feuilles sessiles rapprochées en rosettes denses 7
- Pl. dépourvue de rosettes radicales denses 8