

2. *OENOTHERA* L. Onagre. Pl. XCVII.

Calice longuement prolongé au-dessus de l'ovaire. Pét. 4, insérés à la gorge du calice. Etam. 8. Capsule à 4 loges, à 4 valves. Graines nues au sommet.

- | | | |
|---|---|-------------------------------|
| 1 | Pét. obovales, de moitié plus courts que le tube du calice, dépassant les étamines. Feuilles radicales obovales ou elliptiques, obtuses, mucronées (Pl. XCVII, fig. 1). | 1362. <i>O. biennis</i> L. |
| | | <i>O. bisanusselle</i> @. |
| | | <i>E.</i> Bords des eaux. AR. |
| 1 | Pét. obovales, deux fois plus courts que le tube du calice, égalant les étamines. Feuilles radicales oblongues-lancéolées acuminées. | 1363. <i>O. muricata</i> L. |
| | | <i>O. muriquée</i> @. |
| | | <i>E.</i> Bords des eaux. RR. |

Justiées Endl.

Calice à tube non prolongé au-dessus de l'ovaire, à 3-5 div. Étamines 6-10 ou 2-3. Capsule à déhiscence septicide.

1. *ISNARDIA* L. Isardie.

Calice à 4 div. Pét. 4, quelquefois nuls. Ét. 4. Capsule à 4 angles, à 4 valves, à 4 loges polyspermes.



Pl. XCVI. — 1. *Epilobium spicatum*, portion d'inflorescence, 1/2 gr. n. — 2. *Circea lutetiana*, sommet, 1/2 gr. n.

- | | |
|--|-------------------------------|
| Fl. petites, verdâtres, solitaires axillaires. Viges tétra-gones, couchées-radicantes. Feuilles entières, ovales-aiguës, pétiolées. Pl. glabre, souvent rougeâtre. | 1364. <i>I. palustris</i> L. |
| | <i>I.</i> des marais @. |
| | <i>M.</i> Marais tourbeux. R. |