

Rayons de l'ombelle épaissis dans toute leur longueur à la maturité. Involucelle à folioles lancéolées acuminées, à bords scarieux. Aiguillons terminés par 1-3 pointes inflexées.

Réceptacle portant les rayons de l'ombelle très dilaté, convexe en dessus

Réceptacle de l'ombelle non dilaté


1528. *D. siculus* Tin.

D. de Sicile ☉.

V. A. Côte méditerr. R.

5

6



Pl. CIV. — 1. *Daucus carota*, ombelle florifère, 1/2 gr. n.; coupe transversale d'un akène (épaissi). — 2. *Ortaya grandiflora*, sommité, 1/2 gr. n.; coupe transversale d'un akène. — 3. *Targemna latifolia*, ombelle, 1/2 gr. n.; coupe transversale d'un akène. — 4. *Caricollis daucoides*, sommité, 1/2 gr. n.; coupe transversale d'un akène.

Fl. de la circonférence presque égales à celles du centre, non rayonnantes. Involucelle à folioles lancéolées, — entières ou trifides, membraneuses aux bords.

Fl. de la circonf. bien plus grandes que celles du centre, fortement rayonnantes. Involucelle à folioles inégales, très étroites, — entières ou à divisions subulées.

Somme de plusieurs variétés de Carottes cultivées.

Feuilles inf. à circonscription triangulaire

Feuilles inf. à circonscription oblongue

Involucelle à folioles linéaires, entières ou trifides.

Fruit ellipsoïde, armé d'aiguillons élargis et confluent à la base. — Fl. centrale non purpurine.

Involucelle à folioles lancéolées, entières ou trifides, concaves. Fruit petit, ovoïde, muni d'aiguillons écartés, distincts à la base. — Fl. centrale purpurine, stérile.

1529. *D. mauritanicus* L.

D. de Mauritanie ☉.

A. Rochers maritimes. RR.

1530. *D. maximus* Desf.

D. très grand ☉.

V. A. Coteaux arides. RR.

1531. *D. Beccomii* Guss.

D. de Beccome ☉.

A. Région méditerr. R.

1532. *D. Gingidium* L.

D. Gingidium ☉.

A. Rochers maritimes. RR.

7

8