


raux écartés du bord; côtes secondaires larges, rugueuses. Commissure munie de deux orifices. Columelle adhérente aux carpelles, bipartite. — Feuilles inférieures pinnatiséquées. Involucre et involucelles nuls ou à 1 foliole.

- 1 } Umbelle à trois rayons striés. Umbellules à deux-trois fl. toutes fertiles, les extérieures à pétales non rayonnants. Fruit mamelonné au sommet. — Feuilles caulinaires bipinnatiséquées, à segments linéaires (Pl. CV, fig. 3). **1545. B. testiculata** DC. B. à testicules ♂. V. Moissons du midi. R.
- 1 } Umbelle à cinq-sept rayons grêles. Umbellules multiflores, les fleurs centrales stériles, les extérieures à pétales rayonnants. Fruit échancré au sommet. **1546. B. radians** Gœch. B. rayonnante ♂. A. Moissons. RB.

2. CORIANDRUM L. Coriandre. Pl. CV.

Calice à cinq dents inégales. Pét. obovales, échancrés, à pointe inféchie. Fruit globuleux, à axes nuls de 5 sillons correspondant aux côtes primaires. Côtes



Pl. CV. — 1. *Torilis anthriscus*, sommet, 1/2 gr. n.; diamètre et coupe transversale d'un axène. — 2. *T. nodosa*, part. 1/2 gr. n. — 3. *Bifora testiculata*, portion d'inflorescence, 1/2 gr. n.; coupe transversale d'un axène. — 4. *Coriandrum sativum*, ombelle, 1/2 gr. n.; coupe transversale d'un axène. — 5. *Lycopodium latifolium*, ombelle, 1/3 gr. n.; fruit, coupe transversale d'un axène. — 6. *Silyb. trilobum*, ombelle, 1/3 gr. n.; pétale.

secondaires carénées. Commissure munie de 2 bandes lisses. Columelle adhérente, bifide. — Involucre nul.

Ombelle à 5-10 rayons. Fl. extérieures à pétales rayonnants. Feuilles inf. pinnatiséquées, à segments larges, cuneiformes, dentés, les sup. bi-pinnatiséquées, à segments divisés en lamelles linéaires. Fl. blanches ou roses (Pl. CV, fig. 4).

Cette plante répand à l'état frais une forte odeur de punaise. Les graines sont carminatives et entrent dans la composition de l'eau de Mélisse.

1547. C. sativum L. C. cultivée ♂. E. Cultivé et subspont.