

Feuilles à circonscription ovale, bipinnatiséquées, à segments divisés en lamères lancéolées-linéaires, aiguës. — Fl. blanches, polygames (Pl. CIX, fig. 4).

1592. *M. Mutellina*


Gorta.

*M. Mutellina* Z.

E. Montagnes. RR.

4. *SILAUS* Besser. *Silaus*. Pl. CIX.

Calice à limbe obitéré. Pét. obovales, un peu échancrés, infléchis en dedans, tronqués à la base, sessiles. Fruit oblong. Côtes saillantes, carénées, aiguës, égales. Vallécules à plusieurs bandelettes. Columelle bipartite. — Involucre nul.



Pl. CIX. — 1. *Toradylthum Apulum*, ombelle, 1/2 gr. n.; fruit. — 2. *Gagea streptera*, ombelle, 1/2 gr. n.; feuille; coupe transversale de l'akène. — 3. *Crithmum maritimum*, ombelle fructifère, 1/2 gr. n.; coupe transversale de l'akène. — 4. *Meum Mutellina*, sommité, 1/2 gr. n.; coupe transversale de l'akène. — 5. *Silaus postensis*, ombelle, 1/2 gr. n.; fruit; coupe transversale de l'akène. — 6. *Ligusticum ferulaceum*, ombelle, 1/2 gr. n.; coupe transversale de l'akène. — 7. *Athamanta cretensis*, ombelle, 1/2 gr. n.; coupe transversale de l'akène.

Involucre à une-deux folioles. Styles plus longs que le stylopede. Fruit oblong. Souche non stolonifère. — Fl. jaunâtres. Feuilles bi-tripinnatiséquées (Pl. CIX, fig. 5).

1593. *S. pratensis* Ess.

S. des prés. Z.

A. Pres humides. R.

Involucre à cinq-sept folioles. Styles plus courts que le stylopede. Fruit ovoïde. Souche stolonifère. — Fl. verdâtres. Feuilles bipinnatiséquées.

1594. *S. virescens* Boiss.

S. verdâtre Z.

E. Coteaux arides. RR.

5. *LIGUSTICUM* L. Livèche. Pl. CIX.

Calice à 3 dents, parfois obitérés. Pét. obovales, ongiculés, échancrés, à pointe infléchie. Fruit ovoïde ou oblong. Akènes à bords contigus. Côtes saillantes, un peu ailées, presque égales. Vallécules à bandelettes nombreuses. Columelle bipartite. — Feuilles très divisées.