

14. *ÆTHUSA* L. Éthuse. Pl. CXI.

Calice à limbe obitéré. Pét. obovales, échancrés, à pointe inflexée, les ext. rayonnants. Fruit globuleux. Carpelles à côtes saillantes carénées, les latérales un peu plus larges et étroitement ciliées. Vallécules à 1 bandelette. Columelle libre, bipartite. — involucre aui ou à 4 foliole.

Involucelles à 5 folioles placées du côté externe de 1613. *Æ. Cynapium* L.  
l'ombelle, réfléchies. Fl. blanches. Feuilles d'un vert E. Ache-de-chien (J).  
sombre, triangulaires, bi-tripinnatiséquies, à seg- *Æ. Lieux cultivés. C.*  
ments divisés en lanères linéaires (Pl. CXI, fig. 2).

15. *CENANTHE* L. Cénanthe. Pl. CXI.

Calice à 5 dents s'accroissant après la floraison. Pét. obovales, échancrés, à lobule inflexé. Fruit oblong, ovoïde ou globuleux. Akenes à bords contigus, à côtes



Pl. CXI. — 1. *Feniculum officinale*, ombelle, 1/2 gr. n.; coupe transversale d'un akène. — 2. *Æthusa Cynapium*, ombelle, 1/2 gr. n.; coupe transversale d'un akène. — 3. *Cenanthe patula*, ombelle, feuille, 1/2 gr. n.; coupe transversale d'un akène. — 4. *O. Phellamium*, ombelle, 1/2 gr. n. — 5. *Eupatorium prostratum*, portion d'inflorescence, 1/2 gr. n. — 6. *B. sticticum*, ombelle, 1/2 gr. n. — 7. *B. falcatum*, sommité, 1/2 gr. n.

*olutes*. Vallécules à 1 bandelette. Columelle indistincte. Graine convexe ou arrondie. — Involucre variable.

Pl. centrales des ombellules subsessiles, fertiles, 2. *PROLANNERIUM*.  
1 } colles de la périphérie rayonnantes, pedicellées, stériles  
Pl. toutes également pedicellées, fertiles 1. *CENANTHE VERE*.

Sect. 1. *Cenanthe vere* Gg.

1 } Ombellules fructifères courbées en dessus  
Ombellules fructifères planes en dessus