

Stylos réfléchis, plus longs que l'ovaire. Feuilles inf. pennatiséquées, à 5-7 segments ovales ou lancéolés, aigus ou acuminés, quelquefois cordés à la base. Tige fortement sillonnée-anguleuse (Pl. CXII, fig. 4).

Var. β *dissecta*, feuilles à segments bipinnatifides.

3) Stylos plus courts que l'ovaire. Feuilles inf. pinnatiséquées, à segments ovales-oblongs, dentés, obtus, les sup. ord. réduites à la gaine pétholairo. Tige cylindrique à peine striée (Pl. CXII, fig. 5).

Var. β *poterifolia*, feuilles à segments très petits, suborbiculaires, crénelés; γ *dissectifolia*, feuilles à segments linéaires.

1646. *P. magna* L.

B. élevée 2.

B. Prés, bois. C.


1647. *P. Saxifraga* L.

B. Saxifrage 2.

A. Lieux incultes. CC.

6. BUNIUM L. Bunion. Pl. CXII.

Calice à limbe oblaté, Pét. obovales, échancrés, à pointe infléchie. Fruit ovale ou oblong. Akènes à bords contigus, à côtes filiformes, égales. Vallécules à 1-3 bandes-



Pl. CXII. — 1. *Bunium laisifolium*, ombelle, 1/2 gr. n.; coupe transversale de l'akène. — 2. *Bunium angustifolia*, ombelle, feuille, 1/2 gr. n.; coupe transversale de l'akène. — 3. *Bunium saxifraga*, ombelle, 1/2 gr. n.; feuille; coupe transversale de l'akène. — 4. *P. magna*, segment d'une feuille, 1/2 gr. n. — 5. *Bunium alpinum*, ombelle, feuille, 1/2 gr. n.; coupe transversale de l'akène. — 6. *B. alpinum*, sommet, racine, 1/2 gr. n.

Testes, Columelle fibre, bifide. Graine plano à la face commissurale. — Fl. blanches ou rougeâtres.

1) Racine fibreuse
2) Racine bulbeuse

1. LAMBY.
2. BULLOCASTANUM.