


1. Fruit muni d'écaillés ou de tubercules. Fl. hermaphrodites, en capitules munis de paillettes. 1. ERYNGIUM.
 1. Fruit muni d'aiguillons. Fl. polygames, en capitules dépourvus de paillettes. 2. SANICULA.

1. ERYNGIUM L. Panicaut. Pl. CXVI.

Fl. sessiles sur un réceptacle muni de paillettes, toutes hermaphrodites. Calice à dents foliacées. Pét. échancrés. Fruit couvert d'écaillés ou de tubercules. Akènes sans côtes. Columelle bipartite, adhérente. — Involucre ord. épineux.

1. Capitules presque sessiles
 1. Capitules pédonculés

2
3

Pl. CXVI. — 1. *Hydrocotyle vulgaris*, port, 1/2 gr. n. — 2. *Atractis minor*, sommité, 1/2 gr. n.; feuille radicale, réduite. — 3. *Eryngium europaeum*, portion d'inflorescence, 1/2 gr. n. — 4. *Sanicula europaea*, inflorescence et feuilles radicales, 1/2 gr. n.

- Paillettes du réceptacle égalant les folioles de l'involucre. Calice fructifère à dents étalées. Fruit ovoïde-cylindrique. Pétiole des feuilles radicales à base non épineuse. 1895. E. Barrolieri Boiss. P. de Barrolier (2). A. Côtes de Corse. RR.
2. Paillettes du réceptacle plus courtes que les folioles de l'involucre. Calice fructifère à dents dressées. Fruit globuleux. Pétiole des feuilles radicales à base épineuse. 1896. E. viviparum Gay. P. vivipare (2). A. A. Lieux mondés. RR.
- Dents du calice fructifère étalées en étoile. — Involucre à folioles étalées, à 3 lobes épineux. Fruit bosselé, muni d'écaillés étroites acuminées. Feuilles inf. orbiculaires-réniformes, palmatilobées. Souche émettant des stolons souterrains. 1897. E. maritimum L. P. maritime (2). A. Sables maritimes. C.
3. Dents du calice fructifère dressées. Feuilles inf. ovales-obtusées, cordées à la base, doublement dentées, à dents épineuses. — Folioles de l'involucre étalées, les extér. ord. réfléchies, simples ou tripartites, épineuses. Paillettes entières ou à 2-3 points. Fruit muni de gros écaillés obtusés. 1898. E. alpinum L. P. des Alpes (2). A. Pyrénées des mont. R.
4. Feuilles inf. pinnati-palmatilobées 5