

3. VIBURNUM L. Viorne. Pl. CXVIII.

Calice et corolle à 5 div. Étam. 5. Stigmates 3, sessiles. Fruit bacciforme, à une loge à une graine.

- Fl. à divisions *inégales*, — en cyme lâche, plane, 1712. V. *Opulus* L.
à rameaux glabres. Corolles de la péripérie V. Obier h.
très grandes, irrégulières, planes, blanches, E. A. Bois, hâtes. C.
1 } stériles, les centrales régulières.
Var. à stériles, fl. toutes stériles en corymbe
globuleux.
Fl. à divisions *égales* 2



Pl. CXVIII. — 1. *Adora Moschastelina*, part, 1/2 gr. n. — 2. *Sambucus nigra*, inflorescence, 1/2 gr. n. — 3. *Viburnum Lantana*, inflorescence, 1/2 gr. n.

- 2 } Dents du calice ovales-aiguës. Feuilles ovales-
aiguës, très entières, — coriaces, glanduleuses
en dessous. Fl. blanches en cyme terminale
compacte. 1713. V. *Tinus* L.
V. Tin h.
V. A.-A. Région médit. AR.
- 2 } Dents du calice ovales-obtusés. Feuilles ovales-
obtusés, dentés. — cordés à la base. Fl. blanches,
odorantes, en cyme serrée à rameaux toment-
eux (Pl. CXVIII, fig. 2). 1714. V. *Lantana* L.
V. Munciane h.
V.-A. Bois, haies. C.

Caprifoliées A. Rich.

Corolle tubuleuse-à fendue ou campanulée, à limbe à 2 lèvres ou à 5 divisions. Ovaire à loges ord. pluriovulées.

- 4 } Étamines quatre
1 } Étamines cinq

1. LINNÆA.
2. LONGIERA.