

1. LINNÆA Gronov. Linnée. Pl. CXIX.

Calice à 5 dents. Corolle infundibulée à 3 lobes. Étamines quatre, insérées au fond de la corolle, deux d'entre elles plus longues. Ovaire à 3 loges uniovulées. Baie monosperme par avortement.

Feuilles opposées, brièvement pétiolées, coriaces, ovales, légèrement dentées en scie. Pédoncule allongé, biflore. Fl. rosées (Pl. CXIX, fig. 3). 1715. L. borealis L.
L. du Nord ß.
E. Montagnes. RR.

2. LONICERA L. Lonicère. Pl. CXIX.

Calice à 5 dents. Corolle tubuleuse ou campanulée, bilabiée, à lèvre sup. à 4 lobes, inf. indivise. Étam. cinq. Fruit baciforme à une ou plusieurs graines.



Pl. CXIX. — 1. *Lonicera Perichymatum*, rameau florifère, 1/2 gr. n. — 2. *L. Xylosticum*, branche florifère, 1/2 gr. n. — 3. *Lonicera borealis*, fleur, 1/2 gr. n.

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| { | Tiges volubiles, Fl. en capitules terminaux | 1. <i>Cassiopeina</i> . |
| | Tiges non volubiles. Fl. axillaires sur des pédoncules biflores | 2. <i>Xylosticum</i> . |

Sect. 1. Caprifolium L.

- | | | |
|---|--|---|
| { | Capitules sessiles | 2 |
| | Capitules pédonculés | |
| { | Style glabre. Feuilles caduques, — coriaces, glauques en dessous, elliptiques-emborbicairees. Tiges volubiles; jeunes rameaux pubescents. Fl. purpurines, odorantes. | 1716. L. <i>Caprifolium</i> L.
L. Chèvrefeuille ß.
E. Plante et subspont. |
| | { | Style hérissé. Feuilles persistantes, — coriaces, glauques en dessous, oblongues. Tiges sarmenteuses; jeunes rameaux glabres. Fl. purpurines ou jaunâtres, odorantes. |
| Feuilles supérieures cuneées-perfoliées. — Tiges sarmenteuses, à rameaux ord. hérissés. Fl. purpurines ou jaunâtres, odorantes. | | 1718. L. <i>etrusca</i> Sauls.
L. d'Étrurie ß.
A. Région méditerr. AR. |