

- Feuilles toutes semblables. — pinnatiséquées, à 13-21 segments incisés-dentés ou entiers. Tige de 10-15 déc., sillonnée, fistuleuse.
 Var. *verticillata*, feuilles verticillées par 3.
 — Propriétés antispasmodiques très actives, usitées dans les affections nerveuses sans lésions.
- Feuilles de deux sortes. — les radicales ovales-oblongues, entières ou incisées, les caulinaires pinnatiséquées, à 4-6 segments entiers. Fl. roses, odorantes.
1813. *V. officinalis* L.
V. officinale Z.
 E. Bois, prés. CC.
1814. *V. Phu* L.
V. Phu Z.
 E. Lieux incultes. RR.



Pl. CXXII. — 1. *Contravallus ruber*, partie d'inflorescence, 1/2 gr. n. — 2. *Valeriana dioica*, souche, 1/2 gr. n. ; fleur mâle. — 3. *Valeriana oblonga*, part., 1/2 gr. n. ; coupe transversale du fruit. — 4. *V. carthagen*, fruit coupé en travers. — 5. *V. auricula*, fruit. — 6. *V. scabra*, fruit. — 7. *V. puberula*, fruit. — 8. *V. scularia*, ovaire et limbe du calice, grossi.

- Souche *stolonifère*. — grêle, longuement rampante. Feuilles des stolons et du bas de la tige ovales, entières, les sup. pinnatiséquées. Fl. rougeâtres (Pl. CXXII, fig. 2).
- Souche *non stolonifère*
- Racine *renflée, tubéreuse, ne produisant pas de souches ligneuses persistantes*. — Feuilles inf. ovales ou elliptiques, entières, les sup. pinnatiséquées. Fl. roses.
- Racine *produisant plusieurs souches ligneuses*
- Fruit *mûr à quatre angles*. — la face dorsale plane, la face opposée creusée de 2 sillons dont les bords relevés forment les faces latérales. Fl. roses.
- Fruit *mûr non à quatre angles, ovale comprimé*
- Feuilles *d'un vert tendre un peu glaucescent*. — celles des rejetts ovales, dentées, cordées à la
1815. *V. dioica* L.
V. dioïque Z.
 E. Marais. AC.
1816. *V. tuberosa* L.
V. tubéreuse Z.
 E. Lieux montagneux. RR.
1817. *V. globularisefolia* Ram.
V. à feuilles de globulaire Z.
 E. Pyrénées. AC.
1818. *V. triptoris* L.
V. à feuilles ternées Z.