

2 } très blanches en dessous, rétrécies-triangulaires, les caulis. réduites à des écailles. Fl. blanches en roses.


Style des fl. hermaphrod. à branches courtes, ovales. — Thyse à bractées linéaires-acuminées. Feuilles radic. blanches en dessous, orbiculaires. Fl. blanches. 1867. *P. albus* Gortn. P. blanc 2. V. Montagnes. R.

Sect. 2. *Nardosmia* Cass.

Capitules brièvement pédonculés, à fl. blanches ou rosées, à odeur de vanille. Feuilles radic. vertes en dessous, à limbe orbiculaire cordiforme (Pl. CXXV. fig. 4). 1868. *P. fragrans* Presl. P. odorant 2. H. V. Prés humides. RR.

3. **TUSSILAGO** L. Tussilage. Pl. CXXV.

Fl. Actérogames. Involucre à folioles appliquées, bisériées. Fl. hermaph. peu nombreuses, centrales, tubuleuses. Fl. femelles fertiles, périphériques, ligulées, plurisé-



Pl. CXXV. — 1. *Petalotis fragrans*, sommité, 1/2 gr. n. ; stém. — 2. *Tussilago Farfara*, part. sommité, 1/2 gr. n. ; stém. — 3. *Solidago Virga-aurea*, sommité, 1/2 gr. n. ; stém. — 4. *Pinguicula scordium*, sommité, 1/2 gr. n. ; stém. — 5. *Cotula ambigua*, sommité, 1/2 gr. n. ; stém.

rides. Style à branches courtes, dressées, semi-cylindriques, obtuses, entièrement stigmatifères. Akènes cylindriques, costés, atténués aux 2 extrémités, surmontés d'une aigrette de poils à peine ciliés. Receptacle plan, alvéolé.

Capitules penchés avant la floraison, solitaires terminaux. Feuilles radicales paraissant après les fl., blanches en dessous, orbiculaires, anguleuses, les caulinaires réduites à des écailles violacées. — Fl. jaunes (Pl. CXXV. fig. 3). 1869. *T. Farfara* L. T. Farfara 2. V. Champs humides. C.

Propriétés adoucissantes et pectorales dans les fl., sudorifiques dans les racines.