

Feuilles toutes radicales, pinnatifides, fortement hispides-blanchâtres, à poils raides, simples et entières au sommet. — Pédoncule radical, glabre. Feuilles toutes radicales, d'un vert gai, plus ou moins couvertes de poils 3-5 furqués. — Racine tronquée. Capitule solitaire; pédonc. nu ou muni de 1-3 bractées (Pl. CXLVII, fig. 2).

Var. *a. glabratus*, pl. presque glabre; *g. vulgaris*, pl. hérissé; *g. crispatus*, feuilles crépues, dentées, hérissées; *g. hyoserioides*, feuilles pinnatifides à segments linéaires.

2221. *L. Villarsii* Lois.


L. de Villars  $\Sigma$ .

E. Coteaux arides. RR.

2222. *L. proteiformis* Vill.

l. pratée  $\Sigma$ .

E. A. Bords des chemins. CC.



Pl. CXLVII. — 1. *Leontodon Taraxaci*, part. 1/2 gr. n. — 2. *L. proteiformis*, part. 1/2 gr. n. — 3. *L. crispus*, capitule, 1/2 gr. n.; feuille; akène. — 4. *Picris hieracioides*, sommet, 1/2 gr. n.; aigrette.

Réceptacle à alvéoles non fibrilleux aux bords. — Pédoncules munis de nombreuses bractées appliquées. Akènes brunâtres, plus longs que l'aigrette.

Var. *g. aurantiacus*, H. orangées.

Réceptacle à alvéoles fortement fibrilleux aux bords. — Feuilles dressées, jamais pinnatifides, hérissées de poils 3-4-furqués. Fl. rouges en dessous.

2223. *L. pyrenaicus*

Guss.

L. des Pyrénées  $\Sigma$ .

E. Htes montagnes. AR.

2224. *L. alpinus* Vill.

l. des Alpes  $\Sigma$ .

M. Prairies des Alpes. C.

#### Sect. 3. *Asterothria* Cass.

Capitule solitaire sur un pédoncule radicaux à peine dilaté au sommet, hérissé dans toute sa longueur de poils 3-4-furqués. Feuilles linéolées, raccourcies ou pinnatifides. Aigrette d'un blanc sale (Pl. CXLVII, fig. 3).

2225. *L. crispus* Vill.

l. crépu  $\Sigma$ .

E. Coteaux secs. RR.