


- 3 } Fl. d'un jaune pâle, violacées en dessous. Capitules nombreux, en grappes rapprochées en panicule terminale. **L. flexilis** (2).
E. Région méditerr. AC.
- Fleurs d'un beau jaune en dessus et en dessous. **2259. L. Ghondrilla-**
Akènes d'environ huit mm. Aigrette égalant la **fiora** Bor.
moitié de l'akène. — Capitules en grappes dis- **L. à fleurs de chondrilla** (2)
posées en panicule terminale. **E. Montagnes. R.**
- 4 } Fleurs jaunes en dessus, rougeâtres en dessous. **2260. L. ramosissima**
Akènes d'environ dix mm. Aigrette égalant les **CC.**
trois quarts de l'akène. — Capitules en pani- **L. très rameuse** (2).
cule très large, très rameuse. **E. Lieux montagneux. RR.**



Pl. CL. — 1. *Lactuca Scariola*, sommité, 1/2 gr. n.; akène. — 2. *L. perennis*, sommité, 1/2 gr. n.; akène. — 3. *Frenotheca purpurea*, sommité, 1/2 gr. n.; akène. — 4. *Sonchus arvensis*, sommité, 1/2 gr. n. — 5. *S. oleraceus*, sommité, 1/2 gr. n. — 6. *Mulgedicum alpinum*, sommité, 1/2 gr. n.

- Capitules subsessiles, disposés le long de la tige en grappe spiciforme. — Akènes grisâtres, de moitié plus courts que leur bec. Feuilles canaliculées très entières, linéaires, auriculées.
- 5 } **Var. β runcinata**, feuilles canaliculées rou-
cées.
- Capitules pédonculés, en corymbe ou en panicule Rameaux de l'inflorescence ascendants ou dressés
- 6 } Rameaux de l'inflorescence étalés
Capitules très nombreux, disposés en grappes réunies en large corymbe festigé, montés de nombreuses feuilles et de bractées suborbiculaires-amplexicaules. Bec blanc, un peu plus long que l'akène.
- 7 } **Var. α romana** (laitue romaine, chigou),
feuilles inf. oblongues-ovales, à peine cou-
- 2261. L. saligna** L.
L. à feuilles de saule (2).
E. Lieux montagneux. R.
- 2262. L. sativa** L.
L. cultivée (2).
E. Cultivé et subspont.