

10. HIERACIUM L. Espévière. Pl. CLII, CLIII.

Involucre à folioles ord. imbriquées. Akènes subcylindriques, atténués à la base, costés, tronqués, non rostrés. Aigrette sessile, blanchâtre ou rousse, à poils simples, raides et fragiles. Réceptacle dépourvu de paillettes, à aivéoles brièvement finibriés.

- | | | | |
|---|--|--------------------|---|
| 1 | Akènes ayant environ deux mm. | 1. PILOSCELLOÏDES. | 2 |
| | Akènes ayant environ quatre mm. | | |
| | Renouveau des tiges annuelles ayant lieu par des bourgeons radicaux non aëlés pendant l'hiver, se développant au printemps | 4. ACETERRINA. | |
| 2 | Renouveau des tiges annuelles ayant lieu par des rosettes de feuilles apparaissant à l'automne, et encore visibles au moment de la floraison | | 3 |
| | Involucre à folioles régulièrement imbriquées | 2. AURELIA. | |
| 3 | Involucre à folioles irrégulièrement imbriquées, les extér. simulant des écailles | 3. PULCHERRA. | |



Pl. CLII. — 1. *Soyeria montana*, sommité, 1/2 gr. n. — 2. *Hieracium Pilosella*, port, 1/2 gr. n. — 3. *H. villosum*, port, 1/2 gr. n. — 4. *H. sylvaticum*, sommité, 1/2 gr. n. : feuille.

Sect. I. Piloselloïdes Koch.

Tige normale-mact scapiforme, monosphaïe. — 2308. *H. Pilosella* L.
 Pédoncules radicaux nus, pubescents. Souche rampante, émettant des stolons feuillés (Pl. CLII, fig. 2).
 E. Piloselle L.
 Es. A. Bords des chemins. CC.

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Var. β nigrescens, capitule couvert de poils noirs glanduleux très nombreux ; - <i>Polotarianum</i> , capitule grand, hérissé de longs poils moins non glanduleux ; stolons courts. | |
| | Tige scapiforme, nue ou portant 1 feuille, terminée par un corymbe ou une panicule | 2 |