

LXXVIII. — OLÉACÉES Lindl.


Fl. hermaphrod. ou unisexuelles, régul. Calice persistant, quelquefois nul. Corolle gamopétale, à 4 div., quelquefois nulle. Etam. 2, à filets soudés au tube de la corolle. Ovaire à 2 loges. Style court, très court. Fruit variable. — Arbres ou arbrisseaux à rameaux et feuilles opposés, fl. en panicule.

Fraxinées Bartl.

Fruit sec, en samare, biloculaire, indéhiscent.

1. FRAXINUS Tourm. Frêne. Pl. CLXIII.

Fl. polygames ou dioïques. Calice à 4 lobes, ou nul. Corolle à 4 div. très profondes et linéaires. Ovaire biloculaire. Fruit en samare membraneuse, comprimé



Pl. CLXIII. — 1. *Diopyros Lotus*, portion de rameau, 1/2 gr. n. — 2. *Syrax officinale*, inflorescence, 1/2 gr. n. — 3. *Fraxinus excelsior*, inflorescence, 1/2 gr. n.; fruit.

perpendiculairement à la cloison, ailé au sommet, coriace, oblong, foliacé, indéhiscent, antiloculaire monosperme par avortement.

- 1 | Fl. axillaires, en panicules latérales
2 | Fl. munies de pétales, en thyse terminal

1. FRAXINASTER.
2. CUNCS.

Sect. 1. Fraxinaster DC.

- 1 | Samares longuement oblongues-obovales insensiblement arrondies du sommet à la base, cuculiformes, fortement échancrées et bilobées au sommet. 2506. *F. biloba* GG.
F. bilobé B.
V. E. Rochers, RR.
- 2 | Samares non bilobées
Arbuste de 2-3 m. — Bourgeons petits, bruns. 2507. *F. parvifolia* Luk.
F. à petites feuilles B.
V. E. Liens incultes, RR.
- 2 | Samares étroites, linéaires-oblongues non cuculiformes à la base. Feuilles à folioles ovates-lancéolées.
Arbre élevé