


- 1 } Drupe *amblygée*, obtuse. — Feuilles inf. ovales-
 cordiformes, denticulées-spinuleuses. Petit arbrce
 de quelques m. de hauteur.
 Drupe *apiculée*
 Feuilles *linaires-lancéolées*, très entières. — Ar-
 buste caespiteux, de 1-2 m.
 2 } Feuilles ovales ou ovales-lancéolées, entières ou
 dentées. — Arbuste buissonneux, de 1-2 m.
 (Pl. CLXIV, fig. 5).
2514. *P. stricta* Bertol.
 P. rude δ .
 V.-A. Corse. R.
2515. *P. angustifolia* L.
 P. à feuilles étroites δ .
 V.-E. Région des oliviers. AC.
2516. *P. media* L.
 P. intermédiaire δ .
 V.-E. Région méditerr. AC.

3. **LIGUSTRUM** Tourn. Troëne. Pl. CLXIV.

Calice à 4 dents. Corolle à 4 div., à tube allongé. Étam. incluses. Baie globuleuse, à 2 loges séparées par une mince membrane, ord. disperme.



Pl. CLXIV. — 1. *Syringa vulgaris*, inflorescences, feuille, 1/2 gr. n. — 2. *S. persica*, feuille, 1/2 gr. n. — 3. *Olea europaea*, rameau florifère, 1/2 gr. n. — 4. *Ligustrum vulgare*, inflorescences, 1/2 gr. n. — 5. *Paliurus media*, sommet, 1/2 gr. n. — 6. *Jasminum officinale*, sommet, 1/2 gr. n.

- Pl. blanches, odorantes, brièvement pédicellées, réunies en panicules thyrsoides denses au sommet des rameaux. Feuilles elliptiques. Baies noires (Pl. CLXIV, fig. 4).
2517. *L. vulgare* L.
 T. vulgaire δ .
 E. Bois, haies. CC.

LXXIX. — **JASMINÉES** R. Br.

Pl. hermaphrod., régulières. Calice gamosépale, à 5-8 div. Corolle gamosépale, à 5-8 lobes. Étam. 2. Ovaire libre, à 2 loges. Fruit tantôt bacciforme didyme à 2 graines ou globuleux à 1 graine, tantôt capsulaire à 2 graines. — Arbustes droits ou grimpants. Périsperme presque nul.

1. **JASMINUM** Tourn. Jasmin. Pl. CLXIV.

Calice campanulé, à 5-8 dents. Corolle à 5-8 div., plane, à tube allongé. Baie monosperme.