


- 1 Fl. toutes plantées à l'aisselle des bractées
 Pl. inf. extra-axillaires
 Corolle à tube plus court que le calice. — Fl. 2612 E. vulgare L.
 bleues ou blanches, en petites grappes réunies V. vulgaire G.
 2 en panicule allongée assez étroite. Étam. exsertes (Pl. Gl.XXI, fig. 1). E. lieux arides. C.
 Corolle à tube au moins égal au calice
 3 Feuilles ayant des nervures latérales visibles
 Feuilles n'ayant que la nervure dorsale saillante

2
7
3
4
5

CXXXI. — 1. *Echium vulgare*, sommité, 1/2 gr. n. — 2. *Lithospermum fruticosum*, sommité, 1/2 gr. n. — 3. *Lithospermum officinale*, sommité, 1/2 gr. n. — 4. *L. arvense*, sommité, 1/2 gr. n. — 5. *Pulmonaria officinalis*, sommité, 1/2 gr. n. — 6. *Myosotis pulvstris*, sommité, 1/2 gr. n. — 7. *M. intermedia*, sommité, 1/2 gr. n. — 8. *M. alpina*, sommité, 1/2 gr. n.

- Corolle 2-3 fois plus longue que le calice, un peu courbée en dessus, à limbe brusquement élargi et presque ventru à la partie sup.
- 4 Corolle 2 fois plus longue que le calice, à limbe à peine élargi au sommet. — étroitement obconique. Feuilles sup. atténuées à la base. Poils étalés.
- Tiges couchées ou ascendantes, simples ou peu rampeuses, hérissées de poils raides, dressés presque appliqués. — Fl. d'un bleu violet. Carpelles arrondis sur le dos.
- 5 Tiges à poils étalés
- Tube de la corolle plus long que le calice. — Fl. en grappes lâches réunies en large panicule. Feuilles sup. un peu arrondies à la base.
- 6
2613. *E. plantagineum* L.
 V. à feuilles de plantain G.
 E. lieux arides. S.-AR.
2614. *E. creticum* L.
 V. de Grèce G.
 E. Région méditerr. RR.
2615. *E. maritimum* Willd.
 V. maritime G.
 E. Sables maritimes. RR.
2616. *E. pustulatum* Sibth.
 V. à pastilles G.
 E. Région méditerr. RR.