


- Pl. en glomérules rapprochés et se confondant au sommet de la tige et des rameaux. — Corolle ord. purpurine. Feuilles lancéolées ou linéaires (Pl. CXG, fig. 2).
 Var. β *arenaria*, pl. blanchâtre souvent glanduleuse au sommet.
- Pl. en glomérules tous distincts
 Feuilles régulièrement crénelées, — un peu tomentuses sur les 2 faces, ovales-obtuses, arrondies ou tronquées à la base. Bractées plus courtes que les calices.
 Feuilles dentées-en-scie
2909. *G. angustifolia* Ehrh.
 G. à feuilles étroites (D).
 E. Moissons. CC.
2910. *G. pyrenalca* Bartl.
 G. des Pyrénées (D).
 E. Pyrénées. AC.



Pl. CXG. — 1. *Leonurus Cardina*, sommité, 1/3 gr. n. — 2. *Galopsis angustifolia*, sommité, 1/3 gr. n. — 3. *G. Tetrabit*, sommité, 1/3 gr. n.

- Corolle grande, à tube beaucoup plus long que le calice, élargi à la gorge, à lèvre sup. concave. — Feuilles lancéolées ou ovales, atténuées aux 2 extrémités.
- 4 Corolle petite, à tube à peine plus long que le calice, à lèvre sup. presque plane. — Feuilles ovales ou lancéolées, brusquement contractées en un court pétiole.
- Corolle grande, à tube blanchâtre au moins 4 fois plus long que le calice. — à lèvre sup. jaune, à lèvre inf. jaunâtre avant le lobe moyen violet.
- 5 Var. β *sulphurea*, fl. presque entièrement jaunes.
- Corolle purpurine, rose ou blanche, à tube à peine aussi long que le calice. — Feuilles oblongues-lancéolées, acuminées, en coin à la base (Pl. CXG, fig. 3).
2911. *G. dubia* Leers.
 G. douteux (D).
 E. Moissons. R.
2912. *G. intermedia* Vill.
 G. intermédiaire (D).
 E. Moutagnes. AR.
2913. *G. versicolor* Cur-
 tis.
 G. versicolore (D).
 E. Bois, fossés. RR.
2914. *G. Tetrabit* L.
 G. Tétrabit (D).
 E. Champs, bois. C.