

Feuilles *hastées*, — à gaine persistant jusqu'à la maturité du fruit: gaines laciniées à divisions lancéolées-acuminées.

Peut-être une forme du précédent.

7 Feuilles profondément *sagittées*, — étroitement oblongues ou lancéolées-linéaires. Div. intér. du calice réniformes-suborbiculaires. Fl. en panicule dense.

Var. à *stems*, feuilles très étroites à oreillettes 2-3bées.

3119. *R. amplexicaulis* Lap.

R. amplexicaulis Z.
R. Montagnei RR.

3120. *R. thyrsoides* Desf.

R. thyrsoides Z.
R. Région méditerr. AC.

3. POLYGONUM L. Remoué, Pl. CCH.

Pl. hermaphrod. ou quelquefois polygames. Calice ord. coloré, à cinq, rarement 3-4 div. subégales. Riam. 5-8, opposées. Styles 2-3, libres ou soudés, quelquefois nuls. Stigmates capités, Vraie lenticulaire ou trigone, *inclus*.



Pl. CCH. — 1. *Polygonum Convolvulus*, ramens, 1/2 gr. s. — 2. *P. Persicaria*, sommet, 1/2 gr. n. — 3. *P. aviculare*, sommet, 1/2 gr. n. — 4. *P. Hydrocotyle*, sommet, 1/2 gr. r. — 5. *P. Fagopyrum*, sommet, 1/2 gr. n. — 6. *P. amplexicaulis*, radicles, 1/2 gr. n. — 7. Sommet, 1/2 gr. n. — 8. Feuille, 1/2 gr. s.

- 1 } Fl. fasciculées à l'aisselle des feuilles
 1 } Fl. non fasciculées à l'aisselle des feuilles
 1 } Styles trois, — très courts, libres. Stigmates très
 2 } petits. Embryon latéral
 2 } Style unique, — court, à stigmate trilobé. Calice
 2 } accrescent. Embryon latéral
 3 } Fl. en épis terminaux
 3 } Fl. en grappes paniculées ou en corymbe

3. *AVICULARIS.*

4. *HEXANE.*

32

4