


Fl. verdâtres, naissant à la base des jeunes rameaux. 3169. *H. rhamnoides* L.
Baies d'un jaune orangé, grosses comme un pois. A. faux-Nerprun x.
Feuilles lancéolées-oblongues, entières (Pl. CCIV, *Æ. Région maritime*. C.
fig. 2).

2. *ELÆAGNUS* L. Chalef. Pl. CCIV.

Fl. hermaphrod. ou polygames. Calice tubuleux, à limbe régulièrement campanulé
4-6 div. diam. 4-6. Prolongement du disque annulaire ou conique, surmontant la
gorge du calice. Akéno recouvert par le calice gonflé, charnu.



Pl. CCIV. — 1. *Ostrya alba*, rameau, 1/2 gr. n. — 2. *Hippophae rhamnoides*, rameau, 1/2 gr. n. — 3. *Elæagnus angustifolius*, rameau, 1/2 gr. n. — 4. *Cytinus Hypocistis*, port, 1/2 gr. n. — 5. *Aytolochia europæum*, fleur et feuille, 1/2 gr. n. — 6. *Aytolochia Pistolochia*, ramaisé, 1/2 gr. n.

Fl. 2-3 à l'aisselle des feuilles, pédicellées. Calice argé-
genté en dehors, jaune en dedans, à odeur agréable. 3170. *E. angustifolium*
L.
Feuilles alternes, ovales-lancéolées ou oblongues C. à feuilles étroites D.
(Pl. CCIV, fig. 3). V. *Æ. Cultivé.*

CVI. — CYTINÉES A. Brong.

Fl. hermaphrod. ou unisexuelles. Calice adhérent ou libre, tubuleux-campanulé, à
4-6 div. Et. 8-13, extorses, soudées à une colonne centrale. Ovaire uniloculaire.
Stylé terminal, simple, libre.

1. *CYTINUS* L. Cytinet. Pl. CCIV.

Fl. monoïques, terminales à l'aisselle de bractées écailleuses, les inf. femelles, les
sup. mâles. Fl. mâles : calice tubuleux-campanulé, à 3-4 lobes; ét. en nombre
double. Fl. femelles : calice semblable; ovaire infers, uniloculaire, à 8 placenta
parietaux. Fruit bacciforme, mou, pulpeux.

Fl. 8-10, subsessiles, terminales, concolères aux écailles 3171. *C. Hypocistis* L.
cuillet dépassent un peu. Tiges de 5-8 cent. épaisses C. des Cistes x?
ses, charnues, d'un jaune rougeâtre (Pl. CCIV, fig. 4). V. Région méditerr. AC.
Parasite sur les racines des Cistes truliculées.