

- Tiges herbacées. — toujours simples. Fl. monoïques, les mâles en glomérules espacés sur la moitié sup. d'un pédonc. axillaire; les femelles solitaires axillaires, longuement pédonculées.
- Tiges ligneuses à la base
- Capsule glabre. — Fl. dioïques, les mâles en glomérules sur un pédoncule commun axillaire, les femelles axillaires, brièvement pédonculées.
- Capsule tomenteuse. — Fl. dioïques, les mâles en glomérules sur un pédoncule commun axillaire, les femelles axillaires, brièvement pédonculées.
3226. *M. perennis* L.
M. vivace L.
V. Bois. C.
3227. *M. corsica* Cass.
M. de Corse D.
E. Corse. H.
3228. *M. tomentosa* L.
M. tomenteuse H.
V. A. Région méditerr. R.

3. CROZOPHORA Neck. Tournef. Pl. CCVI.

Fl. monoïques, jamais réunies dans un involucre commun. Fl. mâles : calice à 3 div. ; pét. 3 ; étam. 5 ou 8-10, à filets soudés à leur base en une colonne centrale ;



Pl. CCVI. — 1. *Mercurialis annua*, sommité, 1/2 gr. n. — 2. *Crozophora tinctoria*, sommité, 1/2 gr. n. — 3. *Durus sempervirens*, sommité, 1/2 gr. n. — 4. *Empetrum nigrum*, rameau, 1/2 gr. n.

anthères adhéses au filet prolongé au-dessus. Fl. femelles : calice à 10 div. ; corolle nulle ; styles 3, bifides ; capsula à 3 côques monospermes.

Fl. mâles brièvement pédonculées, en petite grappe spiciforme assez compacte ; pét. d'un bleu jaunâtre.

Fl. fem. 2-3, sur des pédoncules assez longs. Feuilles rhomboidales (Pl. CCVI, fig. 2).

Fournit une couleur bleue très employée comme réactif.

CIX. — EMPÉTRÉES Nuttall.

Fl. régul., dioïques ou polygames. Calice libre, à 3-2 folioles. Corolle hypogyne, à pét. alternes. Étam. alternes. Filots libres, saillants. Ovaire à 3-6-9 loges. Style court ; stigmat. à lobes rayonnés. Fruit drupacé, sphérique-déprimé, ombilicé, à 2-9 pyrènes osseuses. Graines solitaires, à testa membraneux. Périsperme charnu.

1. EMPETRUM Tournef. Camarin. Pl. CCVI.

Calice coriacé, à 2 sép., entouré à la base par 6 écailles imbriquées. Pét. 3, alternes. Étam. 3. Drupe bacciforme, à 3-9 pyrènes.