

sées. Ovaire uniloculaire. Ovaie unique, latéral. Stigmates 2. Fruit drupace à peine charnu. Graine suspendue, courbée.


1. CELTIS Tourn. Mécocouiller. Pl. CCVII.

Pl. hermaphrod. ou polygames. Calice à 5 fol. égales. Stigmates 2, pubescents-glanduleux. Fruit drupace, à 1 pyrène monosperme. Embryon courbé, à cotylédons condupliqués entourant un perisperm central subgélatineux.

Pl. bianchâtres, solitaires axillaires, pédicellées. Feuilles alternes, ovales-lancéolées acuminesées, dentées, soabres en dessus. — Arbre ou arboisseau à écorce presque noire (Pl. CCVII, fig. 3).

CXIII. — ULMACÉES Mirbel.

Pl. ord. hermaphrod. Calice persistant, à 3 ou 4-8 dir. sondées, campanulé ou turbiné. Et. ord. en nombre égal aux dir. calicinales, opposées. Ovaire hirs., formé de 2 carpelles à bord interne inéchi en cloison. Ovaie suspendue, réflechi, solitaire,



Pl. CCVII. — 1. *Morus alba*, portion de rameau, 1/2 gr. n. — 2. *Ficus carica*, portion de rameau, 1/2 gr. n. — 3. *Celtis australis*, inflorescence, 1/2 gr. n. — 4. *Urtica dioica*, portion de rameau, 1/2 gr. n. — 5. *Ulmus campestris*, inflorescence, 1/2 gr. n.; fruit. — 6. *Parietaria officinalis*, portion de tige, 1/2 gr. n.

subterminal. Styles 2, étalés-divariqués. Fruit sec, coriace, lisse ou rugueux, uniloculaire-monosperme. Graine suspendue, à testa membraneux, à raphe saillant. Perisperm nul; embryon droit.

1. ULMUS L. Orme. Pl. CCVII.

Pl. hermaphrod. Calice membraneux, campanulé ou turbiné, à 4-5-8 lobes. Et. 4-5-8. Ovaire ovoïde-comprimé, bilobulé, à 2 loges uniovulées. Styles 2; stigmates internes. Fruit comprimé, indolissant, largement allié tout autour.