


Anthères biloculaires, s'ouvrant en long. Ovaïres 2-6, ou davantage, verticillés ou réunis en tête, 1-2-ovulés. Péricarpe nu; embryon plié.

- |   |   |                |   |
|---|---|----------------|---|
| 1 | { Fl. moniques                            | 3. SAGITTARIA. | 2 |
|   | { Fl. hermaphrodites                      |                |   |
| 2 | { Carpelles libres                        | 1. ALISMA.     |   |
|   | { Carpelles soudés par la suture ventrale | 2. DAMASONIUM. |   |

1. ALISMA L. Fluctau. Pl. CCXV.

Fl. hermaphrodites. Ét. ord. 6-12. Fillets 6-floèmes. Carpelles nombreux, verticillés ou en tête, libres, uniloculaires, à 1 graine basilaire, pléio-unciforme, à testu membraneux.



Pl. CCXV. — 1. *Alisma ranunculoides*, part. 1/2 gr. n. — 2. *A. natans*, part. 1/2 gr. n.

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | { Fl. en panicule pyramidale   | 2 |
|   | { Fl. en ombelle, ou axillaires  |   |
|   | { Carpelles à peine comprimés latéralement. —  | 4 |
|   | { renflés-obovales, verticillés en tête globuleuse.  |   |
| 2 | { Feuilles toutes radicales, ovales-oblongues, profondément cordées à la base.   | 3 |
|   | { Carpelles très comprimés latéralement  |   |
|   | { Style plus court que l'ovaire. — Panicule à axe et à rameaux recourbés. Carpelles dressés, entièrement contigus à la face interne. Feuilles lan-céolées, jamais en cœur. | 3 |
| 3 | { Style plus long que l'ovaire. — Carpelles à sommet gibbeux, arrondi, contigus seulement à la base du bord interne. Feuilles cordiformes.                                 |   |
|   | { Var. $\gamma$ <i>angustifolium</i> , feuilles lancéolées ou linéaires.   |   |
3343. *A. parnassifolium* L.  
F. à feuilles de parnassie  $\gamma$ .  
E. A. Marais. RR.
3344. *A. arcuatum* Michx.  
F. recourbé  $\gamma$ .  
E. Licux humides. RR.
3345. *A. Plantago* L.  
F. Plantain d'eau  $\gamma$ .  
E. Fossés. CC.