

1. TULIPA Tourn. Tulipe. Pl. CCXVIII.


Péricarpie campanulé, à 6 div. libres, caduques, dépourvues de fossettes nectarifères. Et. 6, hypogynes, à anthères mobiles, dressées, percées à la base pour recevoir le filet. Stigmate 3partit, sessile. Capsule trigone. Graines planes.

- 1 } Filets des étam. glabres
 1 } Filets des étam. velus à la base
 1 } Divisions internes du périanthe blanches des deux côtés. — les ext. roses avec les bords blancs, traves marquées en dedans à la base d'une tache violette. Feuilles glauques, lanobolbes-linéaires, canaliculées. Etam. 1 fois plus longus que l'ovaire.
 2 }
 Div. lat. du périanthe non blanches des deux côtés

3361. *T. clusiana* DC.
 T. de Clusius ?
 V. Région méditerr. R.

512

3



Pl. CCXVIII. — 1. *Tulipa præcox*, fleur, 1/2 gr. n. — 2. *T. sylvestris*, fleur, 1/2 gr. n. — 3. *Fritillaria Melegre*, fleur, 1/2 gr. n. — 4. *F. scaberrima*, fleur, 1/2 gr. n.

- 3 } Fl. dressée avant la floraison, non évasée au sommet. — à div. concaves, rouges, tachées de violet à la base, les 3 extér. ovales, brusquement contractées en onglet large vers leur quart inf., les 3 int. plus étroites, elliptiques (Pl. CCXVIII, fig. 1).
 3 } Fl. évasée au sommet
 4 } Stigmates dépassant le diam. de l'ovaire. — Fl. campanulées, rotée à au-dessus du milieu, à div. ovales-elliptiques, d'un beau rouge ou jaunes.
 4 } Stigmates ne dépassant pas le diam. de l'ovaire. — Périanthe à div. non concaves, d'un rouge écarlate en dedans, les 3 intér. plus courtes.

3362. *T. præcox* Ten.
 T. précocæ ?
 V. Région méditerr. R.

3363. *T. Didieri* Jord.
 T. de Didier ?
 V. Lieux herbeux. RR.
 3364. *T. Oculus-Solis*
 St-Am.
 T. Oeil-du-Soleil ?
 V. Lieux herbeux. RR.

4