


Tiges géoés, grimpantes. Fl. petites, verdâtres, en 3485. T. communis L.  
groupes axillaires, les mâles bien plus longues. Base T. communis Z.  
rouge. Feuilles alternes, cordiformes (Pl. CCXXVI, V. A. Bois. AG.  
fig. 1).

## CXXXI. — IRIDÉES Juss.

Fl. hermaphrod., régulières ou irrégulières, sortant d'une spathe. Périanthe à tube soudé à l'ovaire, à 6 segments pétales bisériés. Et. 3, insérées à la base des segments externes du périanthe. Stigmates 3, dilatés au sommet. Ovaire infère, à 3 loges pluriovulées. Capsule à 3 loges polyspermes, à 3 valves, à déhiscence loculicide.



Pl. CCXXVI. — 1. *Tanacetum communis*, inflorescence, 1/2 gr. n. — 2. *Crocus vernus*, fleur, 1/2 gr. n. — 3. *Trichonema bulbocodium*, port., 1/2 gr. n. — 4. *Colanthe*, fleur, 1/2 gr. n.

1	{ Périanthe irrégulier	6. GLADIOLUS.	
	{ Périanthe régulier		2
	{ Etam. agglutinés au style et aux stigmates	5. GYNANDRIS.	3
2	{ Etam. non agglutinés au style et aux stigmates		4
	{ Stigmates bilobés au sommet		5
	{ Stigmates non bilobés au sommet		
	{ Lèvre inférieure des stigmates emarginée ou en-	3. IRIS.	
4	{ tière	4. HERMODACTYLUS.	
	{ Lèvre inf. des stigmates bifide	2. TRICHONEMA.	
	{ Stigmates à deux lobes	1. CROCUS.	
5	{ Stigmates crénelés ou denticulés		

## 1. CROCUS L. Safran. Pl. CCXXVI.

Périanthe régulier, pétales, campanulé, à tube très allongé, à segments externes plus longs que les internes, tous étalés-dressés. Etam. dressés. Style filiforme, naissant presque du bulbe. Stigmates charnus, obconiques, creusés au sommet en une petite coupe dentelée ou crénelée aux bords. Graines subglobuleuses.