

- Feuilles de la spathe inégales, scarieuses aux bords seulement. — Fl. ord. 2, très brièvement pédonculées, blanches, 2 segments égaux en longueur (Pl. CCXXVII, fig. 1).
3495. *I. florentina* L.
I. de Florence Z.
V. Région méditerr. R.

Feuilles de la spathe scarieuses au sommet



Pl. CCXXVII. — 1. *Iris florentina*, fleur, 1/2 gr. n. — 2. *I. foetidissima*, fleur, 1/2 gr. n.

- Tige rameuse, dressée, fistuleuse. Feuilles de la spathe obtuses, — scarieuses dans leurs deux tiers sup. Fl. grandes, solitaires ternées, subsessiles, bleues.
3496. *I. germanica* L.
I. d'Allemagne Z.
E. Vieux murs. AR.
- Tige simple, cylindrique. Feuilles de la spathe subaiguës. — Fl. 1-3, violettes ou jaunes, 3 segments tous presque égaux en longueur et en largeur.
3497. *I. olbiensis* Héron.
I. d'Olbia Z.
V. Région méditerr. AR.

Sect. 2. *Xiphion* Parl.

- 1 Souche horizontale, rameuse, noueuse
- 2 Souche bulbueuse
- 3 Feuilles ensiformes
- 4 Feuilles linéaires
- Segments internes du périanthe dépassant les stigmates. Capsule non apiculée au sommet. — Segments externes bleus, les internes jaunes (Pl. CCXXVII, fig. 2).
3498. *I. foetidissima* L.
I. très fétide Z.
E. Bois humides. R.
- 2 Segments internes du périanthe plus courts que les stigmates. Capsule apiculée au sommet. — Tige rameuse au sommet. Fl. jaunes (Pl. CCXXVIII, fig. 1).
3499. *I. Pseudacorus* L.
I. Faut-Accore Z.
E. Bords des eaux. C.
- 4 Tige plus courte que les feuilles. — comprimée-angulées. Capsule ovoïde, hexagonale. Segments externes blanchâtres veinés de bleu, les internes violets (Pl. CCXXVIII, fig. 2).
3500. *I. graminea* L.
I. à feuilles de graminée Z.
E. Prairies. RR.
- Tige plus longue que les feuilles