


taute, sessile. Masses polliniques *bipartites*. Ovaire non contourné. — Pl. *dépouillée de matière verte*.

Fl. étalées, d'un jaune roussâtre, en épi oblong. Périanthe à div. concaves, obtuses. Labelle à 2 lobes divergents. Feuilles réduites à des écailles brunes (Pl. CCXXXIV, fig. 2). **3554. N. Nidus-Avis** Rich. N. Nid-d'Oiseau ? E. Bois, AC.

**7. LIMODORUM** Rich. Limodore. Pl. CCXXXIV.

Périanthe subcampanulé. Labelle à limbe *entier*, concave, éperonné. Anthère terminale, acutée, oblique, obtuse. Masses polliniques *indivises*, à rétinacle commun. Ovaire non contourné. — Pl. *dépouillée de matière verte*.



Pl. CCXXXIV. — 1. *Cephalanthus rubra*, sommité, 1/2 gr. n. — 2. *Neottia Nidus-Avis*, sommité, 1/2 gr. n. — 3. *Limodorum abortivum*, sommité, 1/2 gr. n.

Fl. grandes, violettes, en grappe lâche, spiciforme. Feuilles remplacées par des écailles engainantes. Tige violacée (Pl. CCXXXIV, fig. 3). **3555. L. abortivum** Swartz. L. à feuilles avortées ? E. Bois montueux, R.

**Gastrodiées Lindl.**

Anthère terminale, libre, caduque, mobile, operculaire. Masses polliniques compactes, à granules fins, agglomérés par l'intermédiaire d'un tissu élastique, atténuées à la base en caudicules réunis par un rétinacle commun. — Pl. parasites.

**1. EPIPOGIUM** Gmel. Épipogon. Pl. CCXXXV.

Périanthe en queue, à div. extér. linéaires, étalées, égales; les intér. un peu plus larges. Labelle dressé, trilobé, à lobes latéraux petits, étalés, le moyen très grand, entier, concave, renflé à la base en un éperon ascendant.