

Fl. 1-7, en épis lâches, jaunâtres. Labelle blanchâtre, muni de petites houppes purpurines. Ovaire turbiné, trigone, droit. Tige portant quelques écailles. Racine ramifiée en forme de corail, écaillueuse (Pl. CCXXXV, fig. 1).


Malaxidées Lindl.

Anthère terminale, libre, mobile, appliquée sur le stigmate. Masses polliniques très compactes, céracées, non atténues au pédicelle. — Ovaire atténue au pédicelle courbure.

- | | |
|--|---|
| $\begin{cases} 1 & \text{Labelle muni d'un épervier} \\ 1 & \text{Labelle dépourvu d'éperon} \\ 2 & \text{Anthère caduc, appendiculée. Rétinacles deux} \\ 2 & \text{Anthère persistante, non appendiculée. Rétinacle unique} \end{cases}$ | 1. CORALLORHIZA. 2
3. LIPARIS.
3. MALAXIS. |
|--|---|

1. CORALLORHIZA Hall. Corallorrhize. Pl. CCXXXV.

Périanthe à div. conniventes, les extér. linéaires-oblongues, les int. égales. Labelle étalé, muni d'un épervier en forme de bourse courte, trilobé, à lobes latéraux très petits. Gynostème droit, demi-cylindrique. Anthère caducque. Masses polliniques bipartites.



Pl. CCXXXV. — 1. *Epipactis Gmelini*, port. 3/2 gr. n. — 2. *Corallorrhiza juncea*, infloresc., 1/2 gr. n. — 3. *Sonchis* et partie inférieure de la tige, 1/2 gr. n. — 4. *Liparis Laxifl.*, sommité, 1/2 gr. n. — 5. *Malaxis palustris*, sommité, 1/2 gr. n.

Pl. verdâtres ou blanchâtres, en épis lâches, 3-12 fls. Pouilles remplacées par quelques longues feuilles engainantes. Racine à fibres très ramées (Pl. CCXXXV, fig. 2, 3).

3557. C. innata R. Br.

C. innata R. Br.

C. innata R. Br.

C. innata R. Br.