

Div. internes du périanthe à cinq nervures. Labelle trilobé, d'un pourpre noir, réfléchi, muni en dessus d'une seule gibbosité; — lobe moyen largement ovale-aigu, glabrescent (Pl. CCXXXVI, fig. 1).

3562. *S. Lingua* L.

H. Langue ?

A. Prairies, collines. R.

Div. internes du périanthe à trois nervures. Labelle trilobé, purpurin, muni à la base de deux gibbosités; — lobes latéraux entièrement cachés dans le casque, le moyen réfléchi, lacolé.


3563. *S. occultata* Gay.

H. cachée ?

V. Région méditerr. RR.

2. ACERAS R. Br. *Aceras*, Pl. CCXXXVI, CCXXXVII.

Périanthe à div. externes conniventes en casque ou étalées. Labelle trilobé, éperonné ou non. Rétinacul unique renfermé dans une burscule. Gynostème non prolongé en bec. Ovaire entouré.



Pl. CCXXXVI. — 1. *Serapias Lingua*, sommité, 1/3 gr. n. — 2. *Aceras anthropophora*, sommité, 1/3 gr. n. — 3. *A. longibracteata*, sommité, 1/2 gr. n.

Labelle dépourvu d'éperon; — d'un jaune ferrugineux, trilobé, à lobe moyen bifide à divisions presque parallèles (Pl. CCXXXVI, fig. 2).

3564. *A. anthropo-*

phora R. Br.

A. Homme-pendu ?

V. E. Pelouses. R.

Labelle muni d'un éperon.

1 Eperon 4-5 fois plus court que l'ovaire

2 Eperon environ égal à l'ovaire

3 Bractées plus courtes que l'ovaire; — acuminées, blanchâtres, membraneuses. Labelle d'un rose pâle, trifide, plus court que l'ovaire. Eperon long de 2 mm.

4 Bractées plus longues que l'ovaire

3565. *A. densiflora* Boiss.

A. à fleurs serrées ?

V. E. Montagnes. R.

Acaoz. — Flore de France.