

Fl. en cyme dichotome, sur un pédoncule radical de 3644. P. Caulini Komig.  
1-2 déc. Feuilles 3-6, radicales, droites, linéaires, P. de Caulini Z.  
obtus, d'un vert foncé (Pl. CCXLV, fig. 2). V. Méditerranée. AR.

2. ZOSTERA L. Zostère. Pl. CCXLV.

Fl. monogyne, portées par un spadice naissant de la face sup. des feuilles fendues longitudinalement à leur base. Spadice aplati, membraneux, nu sur la face dorsale, portant en avant les étam. et les ovaires bisérés, alternes. Périnathe nul. Fl. mâle à une seule anthère subsessile, uniloculaire. Fl. femelle à un ovaire uniloculaire ; style 1, stigmates 2. Fruit en utricule.



Pl. CCXLV. — 1. *Zostera marina*, partie de la plante, 2/2 gr. n. — 2. *Posidonia Caulini*, partie de la plante, 1/2 gr. n.

- Feuilles à trois-cinq nervures. — obtuses, linéaires. Spadice linéaire, à bords repliés en dessus. Feuille spatuliforme s'élargissant insensiblement jusqu'à la naissance du spadice (Pl. CCXLV, fig. 1).
3645. *Z. marina* L.  
*Z. marina* Z.  
E. Côtes maritim. AC.
- Var. *angustifolia*, feuilles longues de 2-3 déc., larges de 2-3 mm. ; spadice à pédoncule plus long que dans le type.
3646. *Z. nana* Roth.  
*Z. nana* Z.  
E. Côtes maritim. AR.
- Feuilles à une nervure. — tronquées ou échancrées au sommet. Spadice étroitement linéaire, muni sur les bords de deux bandelettes courbées vers les pistils.

3. RUPPIA L. Ruppie. Pl. CCXLVI.

Fl. hermaphrodites, 2 ou plus sur un spadice axillaire, filiforme, d'abord renflé dans une gaine spatuliforme. Périnathe nul. Etam. deux, à filets très courts, squamiformes ; anthères biloculaires, fixés par le milieu en dos. Ovaire formé de 4 carpelles libres, à la fin longuement stipités.