


Scirpées Koch.

Fl. hermaphrodites. Écailles florales imbriquées en tous sens.

- | | | |
|---|--|------------------|
| 1 | Style non articulé | 3. FURENA. |
| 1 | Style articulé | 1. CLADIUM. |
| 2 | Soies hypogynes nulles | 2. ERIOPHORUM. |
| 2 | Soies hypogynes plus ou moins développées | 4. SCIRPUS. |
| 2 | Style non renflé à la base | 6. FIMBRISTYLIS. |
| 2 | Style renflé à la base | 7. RHYNOSPORA. |
| 4 | Soies hypogynes longuement saillantes après la floraison | 5. ELEOCHARIS. |
| 4 | Soies hypogynes incluses | |
| 3 | Disque membraneux | |
| 3 | Disque nul | |
| 6 | Épillets en corymbe ou en épi composé | |
| 6 | Épillets en épi simple | |

1. CLADIUM Patr. Brown. Cladion. Pl. CCLIII.

Fl. hermaphrod., en épillets pauciflores formant une anthèle composée. Écailles florales 5-6. Style non articulé, renflé à la base en une sorte de coiffe qui embrasse l'ovaire. Disque nul. Soies hypogynes nulles.



Pl. CCLIII. — 1. *Scleria nigricans*, comités, 1/2 gr. n. — 2. *Cladium Mariscus*, comités, 1/2 gr. n. — 3. *Eriophorum alpinum*, comités fructifère, 1/2 gr. n. — 4. *E. gracile*, comités fructifère, 1/2 gr. n.

Épillets bruns, biflores, nombreux, agrégés, en anthèles 3729. *C. Mariscus* R. Br.
composées terminales et axillaires. Feuilles allongées, *C. Mariscus* Z.
dentelées (Pl. CCLIII, fig. 2). *M. Marais*, fossés. AR.

2. ERIOPHORUM L. Linaigrette. Pl. CCLIII.

Fl. en épillets multiflores formant par leur réunion un ou plusieurs capitules sessiles et terminaux, ou pédonculés et disposés en anthèle simple. Écailles florales peu nombreuses, les inf. stériles. Style non articulé. Disque nul. Soies hypogynes nombreuses, longuement saillantes après la floraison.

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Capitule unique terminal | 2 |
| 1 | Capitules plusieurs, en anthèle simple | 4 |