

- 43 Bractées scarieuses-blanchâtres. — Écailles femelles scarieuses, blanches argentées. Utricules atténués en bec court, conique, obliquement tronqué. **3805. C. alba** Scop.
C. blanc Z.
V. Bois. RR.
- Bractées, au moins les inf., herbacées ou foliacées
Tiges lisses 44
45
- 44 Tiges rudes et velues sur les angles. — Souche caespituse, non stolonifère. Utricules à peine 3gonas, luisants, obtus au sommet non prolongé en bec. **3806. C. pallescens** L.
C. pâle Z.
E. Bois couverts. AC.
- 45 Utricules trigones 46
Utricules globuleux, ovoïdes ou biconvexes 50
- 46 Epis femelles dressés 47
Epis femelles à la fin penchés ou pendants 48



Pl. CAR. — 1. *Caricæ acuta*, sommité, 1/2 gr. n. — 2. *C. glauca*, sommité, 1/2 gr. n. — 3. *C. panicata*, sommité, 1/2 gr. n. — 4. *C. Durbanensis*, sommité, 1/2 gr. n. — 5. *C. usque*, sommité, 1/2 gr. n. — 6. *C. proceræ*, sommité, 1/2 gr. n. — 7. *C. digitata*, sommité, 1/2 gr. n. — 8. *C. ornithogoda*, sommité, 1/2 gr. n.

- Utricules fructifères dépourvus de nervures, elliptiques-trigones, contractés en bec court, arrondi, scarieux et émarginé au sommet. Epis femelles denses. **3807. C. microcarpa** Salzm.
C. à petits fruits Z.
E. Région méditerr. R.
- 47 Utricules fructifères munis de nombreuses nervures, contractés en bec court, oblique, un peu comprimés, denticulé au sommet. Epis femelles lâches, à 6-12 fl. **3808. C. olbiensis** Jord.
C. d'Olbia Z.
V. Région méditerr. R.
- 48 Souche rampante, stolonifère. — Epis femelles filiformes très lâches. Écailles femelles blanchâtres-scarieuses aux bords, munies d'une large nervure verte. Souche caespituse **3809. C. strigosa** Huds.
C. resseré Z.
E. Bois humides. R.