


- 70) Souche rampante, stolonifère 74
 Souche caespiteuse, non stolonifère 73
 Epis femelles 2-3, dressés, — écartés, pédonculés. 3833. *C. hispida* Gand.
C. vein ♀.
 71) Ecaillés femelles bruns, étroitement bordées 73
 de blanc. Bec de l'utricle bilobé. A. Montagnes. RR.
 Epis femelles à la fin penchés 72
 Tiges dressées, triquètres, lisses. Akène brun, 3834. *C. frigida* All.
C. des régions froides ♀.
 elliptique-trigone, longuement stipité. Utricules E. Htes montagnes. R.
 bruns bordés de vert, à bec bifide. Epis femelles
 sup. subsessiles.
 72) Tiges penchées au sommet, à 3 angles obtus. 3835. *C. ferruginea* Scop.
C. ferrugineux ♀.
 Akène brun, obovate-trigone, atténué à la base. A. Htes montagnes. R.
 Utricules à bec émarginé-imbrié. Epis femelles
 tous pédonculés (Pl. CCLXI, fig. 2).



Pl. CCLXI. — 1. *Carex mucronata*, sommet, 1/2 gr. n. — 2. *C. ferruginea*, sommet, 1/2 gr. n.
 — 3. *C. Arua*, sommet, 1/2 gr. n. — 4. *C. distans*, sommet, 1/2 gr. n. — 5. *C. polidota*,
 sommet, 1/2 gr. n. — 6. *C. hirta*, sommet, 1/2 gr. n.

- Tiges triquètres, avec les angles aigus très rudes. 3836. *C. pseudocyperus*
 — Ecaillés femelles longuement subulées, ver- L.
 tes. Epis femelles cylindriques, compacts, pen- *C. pseudo-Souhet* ♀.
 73) dants. E. Marais tourbeux. AC. 74
 Tiges sensiblement lisses 75
 74) Epis femelles penchés ou pendants 77
 Epis femelles dressés
 Utricules biconvexes. — fortement nervés, ova- 3837. *C. levigata* Sm.
C. lisse ♀.
 75) les, à bec bicuspidé, long. Feuilles ayant 2 ligu- E. Prés humides. R.
 les, dont l'une oppositifolées. Ecaillés femelles
 fauves. 76
 Utricules trigones
 76) Ecaillés femelles plus courtes que les fruits, bruns 3838. *C. tenuis* Host.
 avec la nervure verte, ovales-obtus, mu- *C. grêle* ♀.
 cronées. — Epis fem. 2-3, pédonculés. Utricules A. Montagnes. R.
 lancéolés-trigones, non nervés.