

- 3 } nœux plus longuement pédicellés (Pl. CCLXXVIII, fig. 3).  
 Var. *p. umbrosa*, pl. grêle, rameaux très étalés.  
 Tiges *étalées* ou *couchées*. — Grappe spiciforme 4071. *S. loliacea* GG.  
 raide, étroite, distique, subunilatérale, simple S. fausse-ivraie ♂.  
 ou rameuse à la base, à pédic. épais, très courts. *Æ. Sabès martin.* AG.


42. *ÆLUROPUS* Trin. Europe. Pl. CCLXXVIII.

Épillets très brièvement pédicellés, à 3-11 fl. hermaphrod., comprimés par le côté, alternes, appliqués contre l'axe par le côté, réunis en grappe composée, subunilatérale, spiciforme. Glumes 2, inégales, carénées, non ventrues, mucronées, à 3-5 nervures, plus courtes que les fl. Glumelle inf. *cardée*, ovale-oblongue, à plusieurs nervures, *émarginée* au sommet brièvement aristé, la sup. large, *obtusé* ou *trouquée*. Caryopse obovoïde, *convex* en dehors.

Grappe spiciforme, composée, unilatérale, ovale ou 4072. *Æ. littoralis* Parl.  
 oblongue, flexueuse, à rameaux très courts. Feuilles E. littoral ♂.  
 glauques. Binéaires-acuminées. Pl. de 3-5 décim. *Æ. Côte méditerr.* AR.  
 (Pl. CCLXXVIII, fig. 4).

43. *DACTYLIS* L. Dactyle. Pl. CCLXXIX.

Épillets très brièvement pédicellés, à 2-5 fl. hermaphrod., comprimés par le côté, alternes, appliqués contre l'axe par le côté, et réunis en grappe composée subunilat-



Pl. CCLXXIX. — 1. *Dactylis glomerata*, panicule, 1/2 gr. n. — 2. *Diplochne serotina*, panicule, 1/2 gr. n. — 3. *Molinia caerulea*, sommet, 1/2 gr. n.

rale. Glumes 2, inégales, inéquilatères, carénées, non ventrues, mucronées à 1-2 nervures. Glumelle inf. *cardée*, à 1-5 nervures, *entière* ou *émarginée* au sommet aristé; la sup. *bifide*, à lobes aigus, à 2 carènes ciliées. Caryopse subtrigone, oblong, sillonné à la face interne.