

7. GRAMMITIS Swartz. Grammitis.

Sores oblongs ou linéaires, insérés sans ordre.

Frondes de 1-2 déc., à circonscription ovale-oblongue, glabres, bipinnatiséquées, à pétiole égalant le limbe; segments à lobes cunéiformes.


G. *leptophylla* Sw.

G. à feuilles grêles. V.

V. Lieux montueux. RR.

8. WOODSIA R. Br. Woodsia.

Sores arrondis, entourés d'un cercle de longs poils. Sporanges pédicellés, insérés vers le milieu des nervures secondaires.



Pl. CCLXXXVI. — 1. *Botrychium Lunaria*, port. résult. — 2. *Ceterach officinarum*, port. résult. — 3. *Polygonatum vulgare*, frond., 1/2 gr. n. — 4. *Polystichum Ptilimmas*, un segment, 1/2 gr. n. — 5. *P. speciosissimum*, un segment, 1/2 gr. n.

Frondes de 8-15 cm., à circonscription étroitement linéaire-oblongue, plinatiséquées, à pétiole court, poilu-épicilieux. Sores sur 2 lignes à peu près parallèles à la nervure médiane des segments.

4197. W. *hyperborea*

R. Br. W. hyperboréenne ♀.

Æ. Montagnes. RR.

II. — INDUSIATÆ.

Sores munis d'un indusium.

9. ASPIDIUM R. Br. Aspidium.

Sores arrondis. Indusium membraneux, orbiculaire, petit, stipité, libre dans tout son pourtour et seulement attaché par le centre.