

Hypogé, — qui se développe sous terre.

Hypogyne, — se dit des organes de la fleur insérés au-dessous de l'ovaire.

Hypothalle, — portion inférieure du thalle des lichens, ord. adhérente au support.

I

Imbricative, — se dit de la préfloraison quand les lobes sont imbriqués.

Imbriqué, — se dit des organes plans qui se recouvrent comme les tuiles d'un toit (112).

Imparipinné, — se dit de la feuille pinnée dont le pétiole commun est terminé par une foliole (113).

Incisé, — à bords découpés en lobes irréguliers, inégaux (114).

Inclus, — renfermé dans l'organe entourant. Opposé à *exserté*.

Indéfini, — se dit de la tige qui ne se termine pas par une fleur; des étamines, des ovaires dont le nombre est variable ou très considérable.

Indéhiscet, — qui ne s'ouvre pas naturellement.

Induplicative, — se dit de la préfloraison quand les lobes sont verticillés et ont chacun leurs bords rentrés et comme repliés en dedans.

Indusium, — tégument épidermique qui, chez les fougères, recouvre les groupes de spores.

Inerme, — dépourvu d'épines et d'aiguillons.



Infère, — placé au-dessous. Se dit de l'ovaire situé plus bas que les verticilles floraux (115).

Infléchi, — fléchi en dedans.

Inflorescence, — mode de disposition des fleurs.

Infundibulé, — en forme d'entonnoir (116, en coupe longitudinale).

Infundibuliforme, — voyez *Infundibulé*.

Introrse, — se dit des anthères qui s'ouvrent vers l'axe de la fleur.

Involucelle, — verticille de folioles à la base des ombellules.

Involucre, — verticille de bractées placées à la base d'un groupe de fleurs, d'une ombelle, d'un capitule.

Irrégulier, — dont les parties ne sont pas symétriques.

Isosporé, — se dit des cryptogames dont toutes les spores sont semblables, et, par suite, dont le protalle est monoïque.

J

Jonciforme, — semblable à un jonc.

L

Labelle, — division inférieure du périanthe des Orchidées, qui affecte souvent des formes bizarres (117).