

Niederschlesisch-böhmisches Becken	Umgebung von Pilsen	Umgebung von Kladno-Rakonitz	Saar-Revier	
Braunauer Schichten	Schichtengruppe der oberen rothen Schiefer	Rothe Sandsteine und Schiefer	Cuseler Schichten	Rothliegend
Porphyre	Schichtengruppe der dunkelgrauen Schiefer	Kounowaer Schichten	obere	Ottweiler Schichten
Radowenzer Schichten <i>Radowenzer Flötze</i>	<i>Flötzzug</i>	<i>Flötzzug mit Schwarte</i>	mittlere (Arkosen mit <i>Araukarilen</i> )	
Hexenstein-Arkosen (mit <i>Araukarilen</i> )	Schichtengruppe der unteren rothen Schiefer (mit Kaolinsandsteinen und <i>Araukarilen</i> ) ( <i>Flötzschmitzen</i> )	rothe und graue Sandsteine und rothe Schiefer (mit <i>Araukarilen</i> )	untere	
Schwadowitzer Schichten <i>Schwadowitzer Flötzzug</i>	<i>Nürschaner Flötz</i>	<i>Lubnaer Flötz</i>	Saarbrückener Schichten	
Schatzlarer Schichten <i>Schatzlarer Flötze</i>	<i>Radnitzer Flötze</i>	<i>Radnitzer Flötze</i>	Grundgebirge (Devon)	Oberes (productives) Carbon
Waldenburger Schichten ( <i>Liegendzug</i> )	Grundgebirge (zumeist archaische Phyllite)	Grundgebirge (zumeist archaische Phyllite)	Grundgebirge (Devon)	