

*Thallus expallens*, dilute lateritio-cinereus v. argillaceus, crassus, compacte squamosus v. subrosulatus. Apothecia plana thallum vix superantia, lateritio-rufa.

Auf Hornstein vom Rücken des Panaetolikon gegen Kutupa (Nider), offenbar einer feucht gelegenen Stelle entnommen.

**85. Lecanora (Sect. Placodium) crassa** Ach. Univ. p. 413. — Huds. Fl. Angl. II, p. 530 sub *Lichene*.

In den Ritzen des Kalkes der Peristerispitze, II, p. 263 (Halácsy). — Bei Gyphto Castro (Unger, IV). — Bei Argos (Hartl). — Auf Kalkconglomerat von Kalavryta und auf Erde beim Kloster Megaspileion, II, p. 524 (Halácsy). — Auf Erde des Taygetus zwischen 1800 und 2000 m, III, p. 304.

f. *dealbata* Mass. in Sched. 1856, p. 59 et exs. no. 74.

Auf Kalk bei der Quelle Kapsitsa (Nider).

**86. Lecanora (Sect. Placodium) muralis** Schär. Enum. p. 66, tab. 4, fig. 4. — Arld. Jura (Sep.), p. 97 sub *Placodio*. — Schreb. Spic. p. 130 (1771) sub *Lichene*.

Die gewöhnliche Form auf Hornstein der Peristeri-Spitze, II, p. 263 (Halácsy) und auf Sandstein von Makriouni (Nider).

Var. *diffracta* Ach. Prodr. p. 63.

Sehr häufig. Auf Hornstein und auf Schiefer von Liapochori (Nider), hier mit schwarzem Discus. — Vom Godaman, der Oeta und vom Mega Isoma (Nider). — Vom Chelmos, Olenos und dem Panachaikon, II, p. 524 (Halácsy).

f. *areolata* Leight. in Herb. Hepp. sec. Stitzb. Helv. p. 88.

Von der Kyllene, II, p. 524 (Halácsy).

*Thallus omnino crustaceus, ambitu non effigurato et apotheciis plano-immersis.*

Var. *versicolor* Pers. Ust. Annal. 1794, p. 24.

Nicht selten. Auf Kalk der Tringia (Hartl) — vom Kallidromon und von Makriouni (Nider) — vom Panachaikon, II, p. 525 (Halácsy).