

14. August 1900. Ihrer bleichgrünen Färbung und ihres ruhigen Verhaltens wegen bemerkt man sie erst bei näherem Zusehen, obwohl jede Distelpflanze Dutzende von ihnen beherbergt.

* 16. *Poecilimon syriacus* Br. (Additamenta, p. 29; Bolivar, p. 597).

Jenidje-Kalé, Marach, Bimbogha-Dagh (leg. Escalera), Samos (leg. Werner, 28. April 1901).

Sonst noch in Syrien und Armenien.

17. *Poecilimon zonatus* Bolivar (p. 597).
Marach, Bimbogha-Dagh (leg. Escalera).

* 18. *Poecilimon smyrnensis* Br. (Additamenta, p. 29).

Smyrna (Coll. Br.), Petrotá bei Cordelio, auf niedrigen Büschen massenhaft (leg. Werner, 10. Mai 1901).

Isophya Br.

* 19. *Isophya Straubei* Br. (Monogr. Phaneropt., p. 62).

Bosdagh bei Smyrna (Coll. Br.), Petrotá bei Smyrna, Ala-Cheir (Werner), Karaman (Schaffer).

♀ einfarbig-grün oder mit zwei sehr deutlichen, hellgelben Längsbinden auf dem Abdomen; ♂ graugrün. Bei genauerer Betrachtung findet man die ganze Oberseite dicht dunkler punktiert. — Die beiden ♀ ♀ von Karaman gehören wegen des kurzen Pronotums mit deutlichen Kanten und der abgestutzten Flügeldecken wegen zu dieser Art, sind aber noch bunter als die von Ala Cheir, der *I. taurica* Ret. ähnlich.

Sonst noch in der Türkei.

20. *Isophya Paveli* Br. (Pr., p. 275, Retowski, p. 221).

Gemlik (Gömlek) bei Brussa (Mus. Budapest), Sinope (leg. Retowski).

Sonst noch bei Constantinopel.

21. *Isophya Schneideri* Br. (Monogr. Phaneropt., p. 67; Bolivar, p. 599).

Bimbogha-Dagh (leg. Escalera).

Sonst noch bei Baku.

22. *Isophya Brunneri* Bolivar (p. 598).

Bimbogha-Dagh.

23. *Isophya amplipennis* Br. (Pr., p. 278, Retowski, p. 222).